



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ –
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ



2025

КАТАЛОГ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ

Ми працюємо на вашому полі!

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ –

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР

НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

КАТАЛОГ

СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ –

НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

Пшениця м'яка озима

Пшениця тверда озима

Ячмінь озимий (альтернативний)

Ячмінь ярий

Тритикале

Горох

Нут

Соя

Соняшник

Кукурудза

Сорго

Сориз

Люцерна

Еспарцет

Одеса – 2025

*Друкується за рішенням вченої ради інституту,
протокол № 3 від 21.03.2025 р.*

Укладачі:

*Литвиненко М. А., Лифенко С. П., Рибалка О. І., Наконечний М. Ю.,
Паламарчук А. І., Легкун І. Б., Вареник Б. Ф., Гамандій В. Л.,
Січкарь В. І., Домарацький Є. О., Солоденко А. Є.*

За редакцією директора Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, чл.-кор. НААН *Соколова В. М.*

Дається коротка характеристика нових перспективних сортів пшениці м'якої і твердої озимої, ячменю озимого і ярого, тритикале, кукурудзи, сорго, соризу, сояшнику, сої, нуту, гороху, люцерни, еспарцету, створених у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення і включених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Науково-методичні рекомендації

**КАТАЛОГ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ –
НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ**

ЗМІСТ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

ВАГОМА	5
ВЕЛИЧАВА	6
ВИГОДА ОДЕСЬКА	7
ВІДПОВІДЬ ОДЕСЬКА	8
ВІРНІСТЬ	9
ГЕЙЗЕР	10
ГОСПОДАРКА ОДЕСЬКА	11
ГРОМАДА	12
ДАЧНЯНКА	13
ДОВІРА ОДЕСЬКА	14
ЕПІГРАФ	(новинка) 15
ЕПІТЕТ	(новинка) 16
ЕТУАЛЬ	(новинка) 17
ЖИТНИЦЯ ОДЕСЬКА	18
ЗАГАДКА ОДЕСЬКА	19
ЗИСК	20
КАТРУСЯ ОДЕСЬКА	21
КОРОЛЕВА ОДЕСЬКА	(новинка) 22
МАКСИМА ОДЕСЬКА	23
МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА	24
НАСНАГА	25
ОЗОРЯНА	26
ОКРАСА	27
ОКТАВА ОДЕСЬКА	28
ОЛІМПІЯ ОДЕСЬКА	(новинка) 29
ОПТИМА ОДЕСЬКА	30
ОРАНТА ОДЕСЬКА	31
ОСНОВА ОДЕСЬКА	32
ПАЛІТРА	33
ПЕЙЗАЖ	34
ПЕРЕВАГА	35
ПЕРЕМОГА ОДЕСЬКА	36
ПЕРЕПІЛКА	37
ПЕРСПЕКТИВА ОДЕСЬКА	38
ПОЗИЦІЯ ОДЕСЬКА	39
ПОКРОВСЬКА	40
САВЕЛІНА	(новинка) 41
САГА	(новинка) 42
СПАДЩИНА ОДЕСЬКА	43
ТВОРЧИСТЬ ОДЕСЬКА	44

УДАЧА ОДЕСЬКА	45
ФАВОРИТКА ОДЕСЬКА	(новинка) 46
ФОРТЕЦЯ	47
БІЛЯВА	48
ЧОРНОБРОВА	49

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

АЛМАЗНИЙ	50
БОСФОР	51
ЗОЛОТИСТИЙ	52
КОРАЛОВИЙ	53
КРИШТАЛЕВИЙ	54
ЛАЙНЕР	55
НАДІЙНИЙ	56
ПРОЗОРИЙ	57

ЯЧМІНЬ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ

ВАЛЬКІРІЯ	58
ГОРДІСТЬ ПАЛЬМІРИ	59
ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ	60
ДОСТОЙНИЙ	61
ЕВОЛЮЦІЯ	(новинка) 62
РУСИН	(новинка) 63
СКАРБ ПАЛЬМІРИ	64
СНІГОВА КОРОЛЕВА	65

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

АВАТАР	66
АДАПТ	67
ВАКУЛА	68
ГАЛИЧАНИН	69
МОУРАВИ	70
НАДІЙНИЙ	(новинка) 71
НОВИЙ СВІТАНОК	(новинка) 72
СТАЛКЕР	73
АХІЛЛЕС	74

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ

АЛЬБІНА	75
---------------	----

ГОРОХ

БІЛИЙ АНГЕЛ	76
КРУЇЗ	77
ПРИСТАНЬ	78

НУТ

ДОСТАТОК	79
СКАРБ	80
ТРИУМФ	81
ЯРИНА	82

СОЯ

АВРОРА	83
ЕВРІДІКА	84
СЕРЕНАДА	85
ФЕНІКС	86

СОНЯШНИК

БАР'ЄР	(новинка) .. 87
БАСТІОН	88
БУГ	89
ГУСЛЯР	90
САНРОК	91
ТІРАС	(новинка) .. 92

КУКУРУДЗА

МУЗА ФАО 360	93
НОВЕЛА ФАО 250	(новинка) .. 94
ШТОРМ ФАО 360	95
ЮНГА ФАО 260	96

СОРГО ЦУКРОВЕ

ВЕРБЛЮД	97
СТЕПОВИЙ	98

СОРИЗ

МЕРКУРІЙ	(новинка) .. 99
----------------	-----------------

ЛЮЦЕРНА МІНЛИВА

ВЕНЕРА	(новинка) .. 100
ІНТРИГА ОДЕСЬКА	101
ЛАДОСЛАВА	102
ПІВДЕННА КРАСУНЯ	103
СИНЬООКЕ ДИВО	(новинка) .. 104

ЕСПАРЦЕТ ЗАКАВКАЗЬКИЙ

АДАМ	105
Контактна інформація	106

ЗАПРОШУЄМО до Селекційно-генетичного інституту!

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насліднезнавства та сортовивчення – всесвітньо відомий науковий центр генетики, селекції та насадництва сільськогосподарських культур. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 83 визначено як підприємство, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Колективом інституту ведеться наукова робота зі створення нових високопродуктивних сортів та гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур для вирощування в різних агрокліматичних зонах України.

За ознаками жаро- і посухостійкості сорти пшениці озимої селекції СГІ є кращими у світі, що набуває важливого значення у зв'язку з кліматичними трансформаціями останніх років. Особливу увагу селекціонери інституту приділяють створенню сортів з високими показниками якості зерна «сильної» та «екстрасильної» пшениці, а також показникам стійкості до хвороб. Пріоритетними напрямками селекційної роботи по озимому ячменю є створення сортів дворучок, в тому числі голозерних сортів, що поєднують скоростиглість, посухостійкість та крупнозерність; по ярому ячменю – створення сортів, стійких до абіотичних факторів на протязі вегетації.

Створені в інституті сорти гороху, нуту, сої придатні для вирощування в різних агрокліматичних зонах України, характеризуються крупним насінням, є посухостійкими і толерантними до хвороб. Багаторічні трави люцерни та еспарцету – основа стійкої кормової бази, відновлення ґрунтів, збереження їх від ерозії.

Дослідження з селекції перехреснозасипальних культур спрямовані на виведення ранніх, середньоранніх та середньостиглих гібридів кукурудзи зернового та силосного призначення, що вдало поєднують високу адаптивність, зокрема жаро- посухостійкість, і високу та стабільну зернову продуктивність. У селекції соргових культур головним завданням є створення високопродуктивних ранньостиглих сортів соризу, що є високоцінною сировиною для харчової промисловості та гібридів цукрового сорго для виробництва біоетанолу. Створені в інституті гібриди соняшнику вирізняються високою олійністю, у т. ч. підвищеним вмістом олеїнової кислоти, генетично зумовленою стійкістю до основних рас вовчка, несправжньої борошнистої роси, до гербіцидів сульфонілсечовинної групи, толерантністю до загущення, мають зручне промислове насінництво.

Сорти та гібриди створені в Селекційно-генетичному інституті набули широкого розповсюдження як в Україні, так і за її межами. У дослідних господарствах, що входять до мережі інституту, за участі відділу насінництва здійснюється апробація наукових розробок, виробництво і реалізація насіння сільськогосподарських культур, створених вченими інституту. В зв'язку зі змінами клімату, географія сортів та гібридів селекції інституту змінилась: суттєво збільшилась кількість виробників насіння (ліцензіатів) поряд з південними також і у Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях. Сьогодні інститут підтримує тісні науково-технічні зв'язки з багатьма закордонними науковими установами і насінницькими компаніями: в Туреччині, Молдові, Болгарії, Молдові, Литві, Швеції, Азербайджані.

Ми працюємо на вашому полі!

Директор інституту, член-кореспондент НААН Соколов В. М.





ВАГОМА

Високоінтенсивний з високим генетично обумовленим потенціалом урожайності, характеризується високою якістю зерна, добре витримує рані строки сівби

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні – середні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 39 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,4 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 29,4 %
СИЛА БОРОШНА: 380 – 490 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

									9
								8	
								8	
								8	
									9
								8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

								8	
									9
								8	
						7			
					6				
						7			
								8	
								8	

ВЕЛИЧАВА

Інтенсивний з широкою екологічною та агротехнічною адаптивністю (зміна в термінах посіву, зниження норми висіву, попередник)

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,0 – 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 39 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 810 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,2 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 29,5 %
СИЛА БОРОШНА: 290 – 400 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листа	7
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ВИГОДА ОДЕСЬКА

Сорт екстрасильної пшениці з високим потенціалом продуктивності та позитивною реакцією на підвищені дози азотних добрив

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для різних агрофонів та попередників

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (282 – 286 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (102 – 110 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні – оптимальні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 5,0 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,4 – 11,8 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 40,3 – 43,5 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 785 – 815 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,2 – 14,2 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 29,5 – 34,2 %
 СИЛА БОРОШНА: 420 – 460 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	7	
Стеблова іржа	7	
Жовта іржа	7	
Септоріоз листя	7	
Піренофороз	7	
Фузаріоз колоса	9	
Тверда сажка	7	
Борошниста роса	7	

ВІДПОВІДЬ ОДЕСЬКА

Високопродуктивний сорт з групою стійкістю до захворювань

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для різних агрофонів, попередників, та умов зрошення

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (280 – 284 доби)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (90 – 98 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні - оптимальні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 8,2 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 37,1 – 42,0 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 780 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,8 – 14,6 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28 – 32 %
 СИЛА БОРОШНА: 360 – 380 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	7
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	9
Септоріоз листя	8
Піренофороз	9
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ВІРНІСТЬ

Сорт з високим потенціалом продуктивності, ефективно засвоює добрива

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН:	середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
НОРМА ВИСІВУ:	4,0–5,0 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	10,15 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	39–44 г
НАТУРА ЗЕРНА:	802 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14,5 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	28,7 %
СИЛА БОРОШНА:	350 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	7
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	6
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	8
Борошниста роса	7

ГЕЙЗЕР

Високоінтенсивний з високою стійкістю до вилягання, добре переносить високі агрофони та умови підвищеної зволоженості

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 38 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,7 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 27,0 %
СИЛА БОРОШНА: 360 – 450 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	7
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	6
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	7
Борошниста роса	7

ГОСПОДАРКА ОДЕСЬКА

Сорт екстрасильної пшениці з вираженою адаптивністю до факторів змін клімату та високим коефіцієнтом продуктивної куцистості

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для різних типів агротехніки та попередників

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (280 – 285 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (106 – 109 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 2,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,9 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 42 – 44 г
НАТУРА ЗЕРНА: 789 – 820 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 12,8 – 13,7 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28,4 – 33,6 %
СИЛА БОРОШНА: 430 – 480 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість		9
Посухостійкість		9
Жаростійкість		9
Стійкість до вилягання	4.....	9
Стійкість до осипання		9
Стійкість до проростання зерен в колосі		9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	7.....	
Стеблова іржа	7.....	
Жовта іржа	7.....	
Септоріоз листя	7.....	
Піренофороз	7.....	
Фузаріоз колоса		9
Тверда сажка		9
Борошниста роса	7.....	

ГРОМАДА

Інтенсивний, універсального використання з високою посухо- і жаростійкістю, вирізняється підвищеною адаптивністю до факторів в зміні агротехніки та клімату, що зумовлює здатність до стабільних і високих урожаїв зерна високої якості

Тип сорту: інтенсивний
 Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та універсальна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній
 ВИСОТА РОСЛИН: середня
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середні та сереньопізні
 НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,0 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,1 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 39-43 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 825 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,0 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 29,2 %
 СИЛА БОРОШНА: 400 – 420 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посуhostійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ДАЧНЯНКА

Інтенсивний, універсального використання, витривалий до середніх і низьких агрофонів та нетрадиційних попередників, ефективно використовує добрива, обумовлений високий генетичний потенціал урожайності

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середні та середньопізді
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,0 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,1 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 38 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,3 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28,9 %
СИЛА БОРОШНА: 360 – 440 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

									9
									9
								8	
								8	
									9
								8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

								8	
								8	
								8	
						7			
						7			
								8	
								8	
									9

ДОВІРА ОДЕСЬКА

Сорт характеризується скоростиглістю у поєднанні з високою продуктивністю, стійкістю до хвороб та якістю зерна

Тип сорту: універсального типу з максимальною адаптацією до змін клімату
 Рекомендована технологія вирощування: на різних агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: скоростиглий (276 – 280 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (92 – 102 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні – пізні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,0 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,9 – 12,8 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 39,6 – 42,0 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 779 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,8 – 14,6 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 33 – 35 %
 СИЛА БОРОШНА: 360 – 420 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	8
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	9

ЕПІГРАФ

НОВИНКА

Сорт формує високий потенціал продуктивності, скоростиглий, високий рівень морозостійкості та стійкості до вилягання

Тип сорту:

високоінтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньоранній

ВИСОТА РОСЛИН:

середня

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 5,0 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

10,8 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

42 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

828 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

14,1 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

30,0 %

СИЛА БОРОШНА:

330 – 350 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

8

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

6

Піренофороз

7

Фузаріоз колоса

8

Тверда сажка

9

Борошниста роса

8

ЕПІТЕТ

НОВИНКА

З високою продуктивністю та підвищеними адаптивними властивостями, витримує погіршення агрофону та відхилення строків сівби від оптимальних

Тип сорту:

високоінтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

ранній

ВИСОТА РОСЛИН:

середня

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні – середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 5,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

10,7 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

41 – 43 г

НАТУРА ЗЕРНА:

818 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

14,8 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

32,5 %

СИЛА БОРОШНА:

320 – 350 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

9

Посухостійкість

8

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

7

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

8

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

7

Піренофороз

6

Фузаріоз колоса

8

Тверда сажка

9

Борошниста роса

8

ЕТУАЛЬ

НОВИНКА

Інтенсивного типу з високим генетичним потенціалом продуктивності та широкою екологічною пластичністю

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 43 – 46 г
НАТУРА ЗЕРНА: 825 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,4 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 31,3 %
СИЛА БОРОШНА: 320-350 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

8
8
8
7
9
8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

8
8
7
7
6
8
9
8

ЖИТНИЦЯ ОДЕСЬКА

Сорт «сильної» пшениці з груповою стійкістю до хвороб

Тип сорту:

високоінтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

для використання на високих і середніх агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньостиглий (282 – 287 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

короткостебловий (82 – 90 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні – середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

8,3 – 12,9 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

40,9 – 47,2 г

НАТУРА ЗЕРНА:

798 – 820 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,6 – 14,2 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

32 – 36 %

СИЛА БОРОШНА:

340 – 380 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

9

Посухостійкість

9

Жаростійкість

9

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

7

Піренофороз

8

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

7

Борошниста роса

9

ЗАГАДКА ОДЕСЬКА

Сорт володіє високою продуктивністю у поєднанні зі скоростиглістю, витривалістю до екстремальних умов змін клімату та спрощених технологій воєнного стану

Тип сорту: високоінтенсивного типу
Рекомендована технологія вирощування: для вирощування на високих і середніх агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: скоростиглий (275 – 280 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (96 – 104 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,0 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,9 – 8,5 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 43 – 45 г
НАТУРА ЗЕРНА: 798 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 12,8 – 13,6 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 26,5 – 27,8 %
СИЛА БОРОШНА: 310 – 340 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8	
Посухостійкість	8	
Жаростійкість	8	
Стійкість до вилягання		9
Стійкість до осипання		9
Стійкість до проростання зерен в колосі		9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа		9
Стеблова іржа	7	
Жовта іржа	7	
Септоріоз листя	7	
Піренофороз	7	
Фузаріоз колоса		9
Тверда сажка		9
Борошниста роса		9

ЗИСК

Сорт інтенсивного типу з високим генетично обумовленим потенціалом продуктивності та якістю зерна «екстрасильної» пшениці із стабільним проявом за різних умов вирощування

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: рання
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0– 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 37–42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 805 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,5 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 32,0 %
СИЛА БОРОШНА: до 500 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	7
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	9
Борошниста роса	9

КАТРУСЯ ОДЕСЬКА

Сорт з високою стабільністю урожайності і якості зерна у варіюючих умовах вирощування

Тип сорту: **високоінтенсивного типу**
 Рекомендована технологія вирощування: **універсального використання на високих і середніх агрофонах**

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: **еритроспермум**
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: **Степ**
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: **середньостиглий (280 – 285 діб)**
 ВИСОТА РОСЛИН: **короткостебловий (84 – 90 см)**
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: **середньоранні - середньопізні**
 НОРМА ВИСІВУ: **3,0 – 4,5 млн/га**
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: **7,9 – 11,4 т/га**
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: **зерновий**
 МАСА 1000 НАСІНИН: **40,7 – 45,8 г**
 НАТУРА ЗЕРНА: **780 – 800 г/л**

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: **13,8 – 14,5 %**
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: **33 – 38 %**
 СИЛА БОРОШНА: **320 – 340 о.а.**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	6
Жовта іржа	6
Септоріоз листя	8
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	9

КОРОЛЕВА ОДЕСЬКА

НОВИНКА

Високий генетичний потенціал врожайності в поєднанні з адаптацією до змін клімату та стійкістю до основних хвороб

Тип сорту:

універсального типу

Рекомендована технологія вирощування:

для вирощування на високих і середніх агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

скоростиглий (265 – 277 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (96 – 102 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

7,8 – 9,2 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

42 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

792 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,2 – 13,7 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

27,3 – 28,9 %

СИЛА БОРОШНА:

360 – 380 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

8

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

8

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

9

Стеблова іржа

8

Жовта іржа

8

Септоріоз листя

8

Піренофороз

8

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

9

Борошниста роса

8

МАКСИМА ОДЕСЬКА

Сорт з високим генетичним потенціалом врожайності в поєднанні з адаптацією до змін клімату

Тип сорту:

високоінтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

для вирощування на високих агрофонах за інтенсивної технології вирощування та в умовах зрошення

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньопізній (290 – 303 доби)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (96 – 106 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні - оптимальні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

7,9 – 12,5 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

40,0 – 43,0 г

НАТУРА ЗЕРНА:

785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

12,9 – 13,8 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

30 – 35 %

СИЛА БОРОШНА:

320 – 360 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

9

Жаростійкість

9

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Буря іржа

8

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

8

Піренофороз

8

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

8

Борошниста роса

8

МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА

Екстрасильний сорт пшениці з високим потенціалом продуктивності та витривалістю до низьких і середніх агрофонів

Тип сорту: високоінтенсивного типу
 Рекомендована технологія вирощування: для універсального використання на різних агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (280 – 285 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (96 – 98 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - середньопізні
 НОРМА ВИСІВУ: 2,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,6 – 11,5 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 42,0 – 45,0 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 785 – 820 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,3 – 14,6 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 29 – 34 %
 СИЛА БОРОШНА: 486 – 527 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	6
Жовта іржа	6
Септоріоз листя	6
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	9

НАСНАГА

Короткостебловий сорт високоінтенсивного типу, добре витримує погіршення агрофону та відхилення в строках сівби

Тип сорту:
Рекомендована технологія вирощування:

високоінтенсивний
інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:
ГРУПА СТИГЛОСТІ:
ВИСОТА РОСЛИН:
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:
НОРМА ВИСІВУ:
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:
МАСА 1000 НАСІНИН:
НАТУРА ЗЕРНА:

еритроспермум
Степ, Лісостеп, Полісся
середньоранній
низькорослий
оптимальні – середньопізні
4,0 – 5,5 млн/га
11,0 т/га
зерновий
38 – 41 г
808 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:
СИЛА БОРОШНА:

14,4 %
30,2 %
430 – 450 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

									9
								8	
								8	
									9
									9
								8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

								8	
								8	
								8	
						7			
						7			
								8	
									9
									9

ОЗОРЯНА

Короткостебловий, високоінтенсивний сорт, придатний для умов підвищеної зволоженості, стійкий до вилягання

Тип сорту:

високоінтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

ранній

ВИСОТА РОСЛИН:

низькорослий

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні – середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 5,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

11,1 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

38 – 42 г

НАТУРА ЗЕРНА:

795 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

14,0 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

27,3 %

СИЛА БОРОШНА:

340 – 400 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

9

Посухостійкість

9

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

8

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

7

Піренофороз

6

Фузаріоз колоса

7

Тверда сажка

9

Борошниста роса

8

ОКРАСА

Короткостебловий сорт високоінтенсивного типу, добре витримує погіршення агрофону та відхилення в строках сівби

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні – середньопізнi
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,1 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 39 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,5 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28,2 %
СИЛА БОРОШНА: 380 – 420 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8

ОКТАВА ОДЕСЬКА

Сорт з високим потенціалом продуктивності у поєднанні з груповою стійкістю до хвороб, має високі показники якості зерна

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (286 – 288 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: відносно високорослий (104 – 112 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,8 – 11,9 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 42,0 – 44,0 г
НАТУРА ЗЕРНА: 798 – 825 г/л

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ: 12,8 – 13,4 %
ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 29 – 34 %
СИЛА БОРОШНА: 336 – 368 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	7
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	9

ОЛІМПІЯ ОДЕСЬКА

НОВИНКА

Скоростиглий сорт з високими показниками продуктивності і стійкості до хвороб, здатен формувати високу якість зерна

Тип сорту:

універсального типу

Рекомендована технологія вирощування:

для вирощування на середніх і високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

скоростиглий (265 – 279 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

короткостебловий (86–90 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

7,2 – 8,9 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

43 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

785 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,5 – 13,8 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

27,2 – 28,9 %

СИЛА БОРОШНА:

380 – 410 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

8

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

8

Піренофороз

8

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

9

Борошниста роса

9

ОПТИМА ОДЕСЬКА

Сорт характеризується винятково високими показниками посухо-, жаростійкості, формує стабільний рівень продуктивності і якості

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (283 – 285 діб)
ВИСОТА РОСЛИН:	відносно високорослий (102 – 116 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	7,3 – 10,7 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	39,5 – 44,2 г
НАТУРА ЗЕРНА:	785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	13,2 – 14,6 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	32 – 36 %
СИЛА БОРОШНА:	348 – 396 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посуhostійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	8
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	9

ОРАНТА ОДЕСЬКА

Високоврожайний сорт, придатний до пізніх строків сівби, здатний до прискороного проходження процесу загартування

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для вирощування на високих і середніх агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: скоростиглий (275 – 280 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (96 – 99 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - пізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 8,4 – 11,9 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 41,5 – 45,3 г
НАТУРА ЗЕРНА: 785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,2 – 14,6 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 32,5 – 36,4 %
СИЛА БОРОШНА: 348 – 396 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Посухостійкість	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Жаростійкість	.	.	.	.	.	.	.	8	.	
Стійкість до вилягання	.	.	.	.	.	.	.	.	9	
Стійкість до осипання	.	.	.	.	.	.	.	.	9	
Стійкість до проростання зерен в колосі	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	.	.	.	.	.	.	.	8	.	
Стеблова іржа	.	.	.	.	.	.	.	8	.	
Жовта іржа	.	.	.	.	.	7	.	.	.	
Септоріоз листя	.	.	.	.	.	.	.	.	9	
Піренофороз	.	.	.	.	.	.	.	8	.	
Фузаріоз колоса	.	.	.	.	.	.	.	.	9	
Тверда сажка	.	.	.	.	.	.	.	8	.	
Борошниста роса	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9

ОСНОВА ОДЕСЬКА

Скоростиглий сорт сильної пшениці з високим рівнем адаптації до змін клімату на півдні України

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах і попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: скоростиглий (275 – 278 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (90 – 92 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - пізні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,9 – 9,8 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: Зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 40 – 43 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 790 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,2 – 13,6 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 31 – 33 %
 СИЛА БОРОШНА: 360 – 390 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	6
Борошниста роса	8

ПАЛІТРА

Високоінтенсивний з підвищеною морозо-, зимо- та посухостійкістю, добре витримує високий температурний режим в період цвітіння, має здатність до підвищеного кушіння як восени так і весною, добре переносить зменшення норм висіву

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середні – середньопізнi
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 38 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,5 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 27,5 %
СИЛА БОРОШНА: 350 – 400 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стойкість до вилягання
Стойкість до осипання
Стойкість до проростання зерен в колосі

8
9
9
8
9
8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

8
9
8
7
6
8
7
8

ПЕЙЗАЖ

Високоінтенсивний, посухостійкий

Тип сорту:

високоінтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середня

ВИСОТА РОСЛИН:

середня

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні – середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 5,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

10,0 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

40 – 43 г

НАТУРА ЗЕРНА:

795 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,8 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

27,5 %

СИЛА БОРОШНА:

420 – 440 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

9

Посухостійкість

8

Жаростійкість

9

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

8

Жовта іржа

8

Септоріоз листя

7

Піренофороз

6

Фузаріоз колоса

8

Тверда сажка

9

Борошниста роса

8

ПЕРЕВАГА

Інтенсивного типу з високою екологічною пластичністю та підвищеною витривалістю до умов низьких агрофонів і нетрадиційних попередників

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 40 – 43 г
НАТУРА ЗЕРНА: 840 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,1 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 27,8 %
СИЛА БОРОШНА: 380 – 550 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

									9
								8	
								8	
									9
									9
								8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

								8	
									9
							7		
							7		
					6				
								8	
								8	
								8	

ПЕРЕМОГА ОДЕСЬКА

Сорт відносно витривалий до ранніх строків сівби, володіє винятково високою позитивною реакцією на внесення азотних мінеральних добрив

Тип сорту: високоінтенсивного типу
 Рекомендована технологія вирощування: для посіву на високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (282 – 285 діб)
ВИСОТА РОСЛИН:	короткостебловий (82 – 86 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 5,0 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	7,6 – 8,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	43 – 45 г
НАТУРА ЗЕРНА:	790 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	12,6 – 13,4 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	28 – 30 %
СИЛА БОРОШНА:	280 – 310 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

Щиро вдячні колективові Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, який є співзасновником Демонстраційного полігону сучасних сортів зернових колосових культур на полях Миколаївського національного аграрного університету, що є базою практичної підготовки студентів та унікальним майданчиком реалізації інноваційних розробок у виробництво.

Приємно, що за урожайністю сорти всесвітньо визнаного українського селекційно-генетичного центру жодного року не поступалися закордонним та вітчизняним селекційним досягненням, а за хлібопекарськими якостями їм немає рівних.

В. о. ректора, академік НААН
В'ячеслав ШЕБАНИН



В'ячеслав

Кооператив «АГРОСТОК» (Республіка Молдова) вже понад 10 років співпрацює з Селекційно-генетичним інститутом — НЦНС. За цей час сорти, виведені в інституті, поряд з високою якістю зерна демонструють найкращі результати за показниками жаро- і посухостійкості порівняно з іншими сортами.

Аграрії Молдови високо цінують наукові розробки інституту, які є запорукою фінансової стабільності агропідприємств нашої республіки.

Директор Кооперативу «АГРОСТОК»
Ігор ТАГАДЮК





**YILDIZ PLANTBASED PRODUCTS
SEED and AGRICULTURE Ind. Co.**
Cooperation of PBGI and YILDIZ in Turkey

When you meet
with these
Odeska varieties,
that means you
will meet with
STABILITY at yield and
surprising **ADAPTATION**
capability against harsh
conditions. This “performance”
has being tested for many years by the
farmers all over the cereal fields of Türkiye.
No disappointment surprise!!
Thanks to PBGI. Thanks to our dear partner.

Коли ви зустрічаєте сорти одеської селекції,
це означає, що ви отримаєте стабільність
за врожайністю та дивовижну здатність
адаптації до жорстких умов. Ці показники
протягом багатьох років перевірені
фермерами Туреччини на усіх полях, де
вироснуть зернові культури. Жодних
розчарувань та сюрпризів!
Дякуємо СГІ – нашому шановному партнеру!

ПЕРЕПІЛКА

Високоінтенсивний сорт сильної пшениці, степової і лісостепової екології, ефективно використовує добрива на різних етапах розвитку

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньорання
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні – пізні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,4 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 38 – 41 г
НАТУРА ЗЕРНА: 810 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,8 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 27,8 %
СИЛА БОРОШНА: 340 – 420 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

									9
									9
								8	
								8	
									9
								8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

								8	
								8	
								8	
						7			
				6					
								8	
									9
								8	

ПЕРСПЕКТИВА ОДЕСЬКА

Сорт поєднує високу продуктивність, посухостійкість, стійкість до хвороб та витривалість до нетрадиційних попередників

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (285 – 287 діб)
ВИСОТА РОСЛИН:	середньорослий (102 – 109 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	6,9 – 10,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	43,2 – 45,8 г
НАТУРА ЗЕРНА:	785 – 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ:	12,5 – 13,7 %
ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	28 – 33 %
СИЛА БОРОШНА:	355 – 395 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	8
Піренофороз	9
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ПОЗИЦІЯ ОДЕСЬКА

Сорт з високим генетичним потенціалом врожайності в поєднанні з витривалістю до екстремальних змін клімату

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (287 – 290 діб)
ВИСОТА РОСЛИН:	короткостебловий (86 – 90 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні - оптимальні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	7,8 – 12,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	42 – 44 г
НАТУРА ЗЕРНА:	785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	12,8 – 13,6 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	28 – 35 %
СИЛА БОРОШНА:	310 – 350 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	9
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	9

ПОКРОВСЬКА

Сорт відноситься до «екстрасильних» пшениць, витривалий до екстремальних посух

Тип сорту: високоінтенсивного типу з властивостями адаптації до змін клімату

Рекомендована технологія вирощування: для посіву на високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (280 – 283 доби)

ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (90 – 98 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,2 – 12,8 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН: 42 – 43 г

НАТУРА ЗЕРНА: 782 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,4 – 14,2 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 32 – 35 %

СИЛА БОРОШНА: 380 – 420 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	8
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	9

САВЕЛІНА

НОВИНКА

Інтенсивний сорт універсального використання із широкими адаптивними властивостями та витривалістю до деяких відхилень від оптимальних агротехнічних вимог, для вирощування по різних попередниках

Тип сорту:

інтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньоранній

ВИСОТА РОСЛИН:

середня

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні – середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 5,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

10,3 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

42 – 46 г

НАТУРА ЗЕРНА:

820 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,8 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

27,3 %

СИЛА БОРОШНА:

320 – 450 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

9

Посухостійкість

9

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

8

Жовта іржа

8

Септоріоз листя

7

Піренофороз

6

Фузаріоз колоса

8

Тверда сажка

9

Борошниста роса

9

САГА

НОВИНКА

Інтенсивний з високим генетичним потенціалом продуктивності та підвищеною посухостійкістю на різних етапах розвитку, максимально адаптований до змін клімату

Тип сорту:

інтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньоранній

ВИСОТА РОСЛИН:

середня

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середні – середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 5,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

11,2 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

40 – 43 г

НАТУРА ЗЕРНА:

790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,5 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

27,9 %

СИЛА БОРОШНА:

300 – 480 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

9

Жаростійкість

9

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

9

Жовта іржа

8

Септоріоз листя

7

Піренофороз

7

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

7

Борошниста роса

8

СПАДЩИНА ОДЕСЬКА

Широка екологічна пластичність, «сильна» за якістю пшениця

Тип сорту:

універсального типу

Рекомендована технологія вирощування:

для використання на різних агрофонах в широкому діапазоні екологічних умов та змін клімату

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньостиглий (280 – 284 доби)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (98 – 104 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

11,0 – 12,5 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

43 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

790 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,2 – 13,8 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

29 – 33 %

СИЛА БОРОШНА:

320 – 380 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Посухостійкість

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Жаростійкість

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Стійкість до вилягання

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Стійкість до осипання

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Стійкість до проростання зерен в колосі

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Стеблова іржа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Жовта іржа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Септоріоз листя

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Піренофороз

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Фузаріоз колоса

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Тверда сажка

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Борошниста роса

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ТВОРЧИСТЬ ОДЕСЬКА

Висока продуктивність та екологічна пластичність у поєднанні з високими показниками хлібопекарної якості

Тип сорту: високоінтенсивного типу
 Рекомендована технологія вирощування: для посіву на високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	скоростиглий (275 – 280 діб)
ВИСОТА РОСЛИН:	короткостебловий (86 – 90 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	8,4 – 9,5 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	42 – 44 г
НАТУРА ЗЕРНА:	785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	13,2 – 13,8 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	28,4 – 32,3 %
СИЛА БОРОШНА:	340 – 410 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	7
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	6
Септоріоз листя	6
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	6
Борошниста роса	7

УДАЧА ОДЕСЬКА

Сорт екстрасильної пшениці за якістю зерна з високим рівнем продуктивності та адаптацією до факторів зміни клімату

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (280 – 284 доби)
ВИСОТА РОСЛИН:	середньорослий (97 – 102 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні - оптимальні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	8,2 – 12,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	42,8 – 46,5 г
НАТУРА ЗЕРНА:	798 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	13,4 – 13,9 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29,5 – 34,1 %
СИЛА БОРОШНА:	440 – 480 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	7
Борошниста роса	8

ФАВОРИТКА ОДЕСЬКА

НОВИНКА

Сорт формує високу продуктивність у поєднанні з відмінними показниками якості та підвищеною толерантністю до стресових факторів довкілля

Тип сорту:

універсального типу

Рекомендована технологія вирощування:

для посіву на середніх і низьких агрофонах та нетрадиційних попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

скоростиглий (265 – 275 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

відносно високорослий (102–112 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

2,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

7,6 – 8,9 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

42 – 44 г

НАТУРА ЗЕРНА:

790 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,2 – 14,4 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

28,5 – 29,5 %

СИЛА БОРОШНА:

310 – 350 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

9

Посухостійкість

8

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

9

Стеблова іржа

9

Жовта іржа

8

Септоріоз листя

9

Піренофороз

9

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

9

Борошниста роса

8

ФОРТЕЦЯ

Короткостебловий, високоінтенсивний, скоростиглий, стійкий до вилягання, витримує пізні строки сівби

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: високоінтенсивна та інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: рання
ВИСОТА РОСЛИН: середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 40 – 43 г
НАТУРА ЗЕРНА: 810 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,1 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 29,1 %
СИЛА БОРОШНА: 350 – 510 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

8	9
9	9
8	9
8	9
8	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

8	9
9	9
8	9
7	9
7	9
8	9
7	9
9	9

БІЛЯВА

Сорт спеціального призначення – білозерна екстрем'язерна пшениця

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньопізнi
НОРМА ВИСІВУ:	4,0-4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	9,2 т/га
КОЛІР ЗЕРНА:	білий
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	кондитерський
МАСА 1000 НАСІНИН:	41-43 г
НАТУРА ЗЕРНА:	805 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	11,2 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	27,4 %
СИЛА БОРОШНА:	200-210 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8	
Посухостійкість		9
Жаростійкість	8	
Стійкість до вилягання	8	
Стійкість до осипання	8	
Стійкість до проростання зерен в колосі	6	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8	
Стеблова іржа	8	
Жовта іржа	8	
Септоріоз листя	8	
Піренофороз	8	
Фузаріоз колоса	8	
Тверда сажка		9
Борошниста роса	8	

ЧОРНОБРОВА

Сорт спеціального призначення – пшениця підвищеної харчової цінності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньопізнi
НОРМА ВИСІВУ:	4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	8,6 т/га
КОЛІР ЗЕРНА:	темно-фіолетовий
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	хліб, крупи
МАСА 1000 НАСІНИН:	43–45 г
НАТУРА ЗЕРНА:	810 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14,5 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	31,3 %
СИЛА БОРОШНА:	210–230 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	
Посухостійкість	
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	7
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

									9
									9
								8	
								7	
									9
									9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	
Стеблова іржа	
Жовта іржа	
Септоріоз листя	
Піренофороз	
Фузаріоз колоса	
Тверда сажка	
Борошниста роса	

									9
								8	
								8	
								8	
								8	
								8	
									9
								8	

АЛМАЗНИЙ

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (до 56 г), зимостійкий, посухостійкий та жаростійкий

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	леукурум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоспілий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня, перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн. схожих насінин на 1 га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
СИЛА БОРОШНА:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

БОСФОР

Сорт формує крупне зерно (до 54 г), з високими показниками зимостійкості та посухостійкості, високопродуктивний (85-90 ц/га)

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	гордейформе
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоспілий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня, перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн. схожих насінин на 1 га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	85-90 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
СИЛА БОРОШНА:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	9
Септоріоз листя	9
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ЗОЛОТИСТИЙ

Сорт формує крупне зерно (до 56 г), з високими показниками зимостійкості та посухостійкості, високопродуктивний (90-95 ц/га)

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	леукурум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоспілий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня, перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн. схожих насінин на 1 га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
СИЛА БОРОШНА:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

КОРАЛОВИЙ

Сорт формує крупне зерно (до 58 г), з високими показниками зимостійкості та посухостійкості, високопродуктивний (85-90 ц/га)

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	гордейформе
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоспілий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня, перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн. схожих насінин на 1 га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	85-90 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
СИЛА БОРОШНА:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8	
Посухостійкість	9	
Жаростійкість	9	
Стійкість до вилягання	9	
Стійкість до осипання	9	
Стійкість до проростання зерен в колосі	8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8	
Стеблова іржа	7	
Жовта іржа	9	
Септоріоз листя	9	
Піренофороз	8	
Фузаріоз колоса	7	
Тверда сажка	9	
Летюча сажка	9	
Борошниста роса	9	

КРИШТАЛЕВИЙ

Сорт формує крупне зерно (до 55 г), з високими показниками зимостійкості та посухостійкості, високопродуктивний (90-95 ц/га)

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	леукурум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоспілий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня, перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн. схожих насінин на 1 га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
СИЛА БОРОШНА:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ЛАЙНЕР

Сорт формує крупне зерно (до 56 г), з високими показниками зимостійкості та посухостійкості, високопродуктивний (90-95 ц/га)

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	леукурум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоспілий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня, перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн. схожих насінин на 1 га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
СИЛА БОРОШНА:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

НАДІЙНИЙ

Сорт формує крупне зерно (до 55 г), з високими показниками зимостійкості та посухостійкості, високопродуктивний (90-95 ц/га)

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	гордейформе
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоспілий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня, перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн. схожих насінин на 1 га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	крупяна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
СИЛА БОРОШНА:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	9
Септоріоз листя	9
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ПРОЗОРИЙ

Сорт формує крупне зерно (до 56 г), з високими показниками зимостійкості та посухостійкості, високопродуктивний (90-95 ц/га)

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	леукурум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоспілий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня, перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн. схожих насінин на 1 га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	85-90 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
СИЛА БОРОШНА:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ВАЛЬКІРІЯ

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку, належить до європейської екологічної групи, вирізняється високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	80–85
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7–10
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–11,5
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	38–45

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	6
Ринхоспоріоз	6

ГОРДИСТЬ ПАЛЬМІРИ

Середньостиглий сорт голозерного ячменю альтернативного типу розвитку, продуктивний, придатний до механізованого збирання

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	coeleste
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	100–110
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–березень
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,0–8,3
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	11,5–13,8
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	40–44

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	7	
Посухостійкість	7	
Жаростійкість		9
Стійкість до вилягання	8	
Стійкість до осипання	8	
Стійкість до проростання зерен в колосі	8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка		9
Чорна летюча сажка		9
Тверда сажка		9
Борошниста роса	7	
Гельмінтоспоріоз	6	
Ринхоспоріоз	5	

ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку, вирізняється високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	115–125
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7–10,5
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–10
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	47–49

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	6





Співпраця ТОВ «Золотого Колосу» з Селекційно-генетичним інститутом — НЦНС триває вже більше двадцяти років. Як підприємство, задача якого — постачати сільгоспвиробникам якісний посівний матеріал, ми кожного року випробовуємо нові сорти, пропагуючи українську селекцію. Хочу відзначити, що по зерновій групі аналогічної добірки сортів, як в Селекційно-генетичному інституті, немає ні в кого. Сорти СГІ-НЦНС найбільш адаптовані та різноманітні, придатні як під інтенсивні, так і під універсальні технології та різні агрофони. Продуктивні універсальні сорти інституту добре зарекомендували себе в різних умовах, тому насіння цих сортів купують у нас аграрії з різних регіонів України. Навіть якщо конкретні сорти потребують високого рівня вологозабезпечення та захисту, вони особливо інтенсивні на віддачу. Нам є з чим порівнювати: неодноразово спостерігала, як гинуть посіви іноземних сортів в наших складних погодних умовах. Натомість сорти нашого Селекційно-генетичного інституту найбільш адаптовані до таких умов і високо себе зарекомендували. Селекційно-генетичний інститут — НЦНС сьогодні рухається вперед, розвиває науку, залишаючи за собою лідерство у цій ніші.

Директор ТОВ «Золотий Колос»
Надія ІВАНОВА

ДОСТОЙНИЙ

Ранньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку з дуже коротким періодом яровизації, високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	ранньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	90–110
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–березень
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,0–12,0
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	9–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	42–45

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	6
Ринхоспоріоз	6

ЕВОЛЮЦІЯ

НОВИНКА

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку з дуже довгим колоссям, високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	100–115
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7,6–9,3
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	9–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	41,2–44,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	6
Ринхоспоріоз	5

РУСИН

НОВИНКА

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку з високим потенціалом продуктивності для інтенсивних технологій

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	100–105
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7,9–9,5
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	43,9–46,2

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	5

СКАРБ ПАЛЬМІРИ

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку, з високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	100–110
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	6,1–9,5
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–10
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	46,4–48,1

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	6

СНІГОВА КОРОЛЕВА

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку, європейської екологічної групи, вирізняється високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	90–95
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7–10
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	9–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	44–48

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	6

АВАТАР

Сорт ярого ячменю з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	67–71
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	6–7
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно, фураж
ВМІСТ БІЛКА, %:	9–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	50–55

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	8
Ринхоспоріоз	6

АДАПТ

Сорт ярого ячменю, що належить до степової екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	medicum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	70-100
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5-7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7,0-7,5
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	фураж
ВМІСТ БІЛКА, %:	11-12
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	47-63

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	7
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	6
Ринхоспоріоз	6

Сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	80–100
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,0–9,6
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно, солод
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–9
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	44–50
ВИРІВНЯНІСТЬ НАСІННЯ, %:	96
ЕКСТРАКТИВНІСТЬ, %:	>80

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	9
Ринхоспоріоз	7

ГАЛИЧАНИН

Інтенсивний сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН, см:	60–65
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,5–9,0
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно, фураж
ВМІСТ БІЛКА, %:	10–12
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	45–50

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8	
Жаростійкість	8	
Стійкість до вилягання		9
Стійкість до осипання	8	
Стійкість до проростання зерен в колосі	8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	8	
Борошниста роса	7	
Гельмінтоспоріоз	8	
Ринхоспоріоз	6	

МОУРАВІ

Сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкості до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	72–75
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	6,8–9,4
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	10,5
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	48–54
ЕКСТРАКТИВНІСТЬ, %:	78–80

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	8
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	6

НАДІЙНИЙ

НОВИНКА

Сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи, вирізняється високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	75–80
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	6,5–8,3
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	12,5–13,8
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	47–50

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	7
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	6

НОВИЙ СВІТАНОК

НОВИНКА

Сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	72–75
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,7–8,9
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	10,5
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	
ЕКСТРАКТИВНІСТЬ, %:	78–80

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	7
Борошниста роса	9
Гельмінтоспоріоз	8
Ринхоспоріоз	6

СТАЛКЕР

Ранньостиглий сорт ярого ячменю, що належить до степової екологічної групи, урожайний, високостійкий до стресових умов навколишнього середовища, вирізняється високою стійкістю до підвищеного сольового режиму ґрунту

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН, см:	70–100
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,1–5,3
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно, фураж
ВМІСТ БІЛКА, %:	11–12
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	50–55

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	8
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	7

АХІЛЛЕС

Сорт голозерний, дворядний, харчового призначення

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	глабрінудум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	максимально ранні
НОРМА ВИСІВУ:	2,5-3,0 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	7,3 т/га
ЗЕРНІВКА (ПЛІВЧАСТА, ГОЛА):	гола
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	харчовий
МАСА 1000 НАСІНИН:	47-55 г
НАТУРА ЗЕРНА:	790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	17,8 %
ВИХІД КРУПИ:	90,0-92,5 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз сітчастий	8
Летюча сажка	9

АЛЬБІНА

Сорт вперше створений в Україні як сорт технічного спирто-дистилятного напрямку використання. Призначений для виробництва якісного питного етилового спирту і біоетанолу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньопізній
ВИСОТА РОСЛИН:	середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньопізні
НОРМА ВИСІВУ:	2,0-2,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	15,5 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	спирто-дистилятний
МАСА 1000 НАСІНИН:	40-42 г
НАТУРА ЗЕРНА:	740 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	10,7 %
ВМІСТ КРОХМАЛЮ:	75,0-78,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	9
Септоріоз листя	9
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	9

БІЛИЙ АНГЕЛ

Сорт з високими показниками генетичної стійкості до вилягання, придатний до вирощування за інтенсивної технології на високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Середньостиглий,

тривалість вегетаційного періоду 80–85 днів

ВИСОТА РОСЛИН:

50-60 cm

ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:

40 cm

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

4,0 т/га

КОЛІР ЗЕРНА

ЖОБТЕ

ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:

однорідне

ΦΟΡΜΑ 3ΕΡΗΑ:

циліндрична

СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКУ

23%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

Маса 1000 зерен

[illegible]

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Борошниста роса

8

Кореневі гнилі

9

Вірусні хвороби

7





КРУЇЗ

Середньорослий, високопродуктивний сорт, з високими показниками посухо- і жаростійкості, толерантний до основних хвороб, високоурожайний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 75-80 днів

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий, 65-75 см

ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖЬОГО БОБА:

45 см

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

4,0 т/га

КОЛІР ЗЕРНА

жовте

ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:

однорідне

ФОРМА ЗЕРНА:

циліндрична

СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКУ

23%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Стійкість до вилягання

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Стійкість до осипання

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Маса 1000 зерен

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Борошниста роса

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Кореневі гнилі

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Вірусні хвороби

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПРИСТАНЬ

Сорт з високими показниками продуктивності та стійкості до осипання насіння, проявляє високу стабільність за різних умов вирощування

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 75-80 днів

ВИСОТА РОСЛИН:

60-70 см

ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:

45 см

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

4,0 т/га

КОЛІР ЗЕРНА

жовте

ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:

однорідне

ФОРМА ЗЕРНА:

циліндрична

СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКУ

23%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість



Стійкість до вилягання



Стійкість до осипання



Маса 1000 зерен



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Борошниста роса



Кореневі гнилі



Вірусні хвороби



ДОСТАТОК

Сорту притаманна висока посухостійкість, формує крупне за масою 1000 насінин зерно, має високі показники стійкості до основних хвороб

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	40 – 60 см
ВИСОТА КРИПЛЕННЯ НИЖЬОГО БОБА:	25 – 30 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	3,0 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	відсутнє
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	біле
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	світло-жовте
ФОРМА НАСІНИНИ:	від кулястої до кутастої
РЕБРИСТІСТЬ:	помірна
ВМІСТ БІЛКА:	до 27,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	7
Аскохітоз	7

СКАРБ

Сорт формує крупне за масою 1000 насінин зерно, має високі показники стійкості до комплексу основних хвороб, відноситься до цінних сортів

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	55 – 65 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	22 – 24 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	3,6 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	відсутнє
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	біле
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	бежеве
ФОРМА НАСІНИНИ:	від кулястої до кутастої
РЕБРИСТІСТЬ:	помірна
ВМІСТ БІЛКА:	до 30,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	7
Аскохітоз	7

ТРИУМФ

Сорт формує крупне зерно, толерантний до комплексу основних хвороб, відноситься до цінних сортів

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	55 – 60 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	20 – 22 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,4 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	відсутнє
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	біле
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	бежеве
ФОРМА НАСІНИНИ:	від кулястої до кутастої
РЕБРИСТІСТЬ:	слабка
ВМІСТ БІЛКА:	до 28,9 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	7
Аскохітоз	7

ЯРИНА

Перший у світі сорт проміжного типу, який формує крупне насіння, високорослий, має високі показники стійкості до основного комплексу хвороб, відноситься до цінних сортів

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	55 – 60 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	20 – 22 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	5,0 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	наявне
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	пурпурово-рожеве
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	коричневе
ФОРМА НАСІНИНИ:	від кулястої до кутащої
РЕБРИСТІСТЬ:	відсутня або дуже слабка
ВМІСТ БІЛКА:	до 28,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	8
Аскохітоз	8

АВРОРА

Сорт посухостійкий і високоадаптивний до умов вирощування, має відмінні показники стійкості до комплексу основних хвороб, добре розкриває свій потенціал продуктивності за інтенсивної технології вирощування

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	від раннього до середнього (середньоранній)
ТИП РОСТУ:	детермінантний
ВИСОТА РОСЛИН:	70 – 100 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖЬОГО БОБА:	12 – 19 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,9 т/га
ЗАБАРВЛЕННЯ ОПУШЕННЯ:	рудувато-коричневе
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	фіолетове
ЗАБАРВЛЕННЯ ОБОЛОНКИ НАСІНИНИ:	зеленувато-жовте
ЗАБАРВЛЕННЯ РУБЧИКА НАСІНИНИ:	темно-сіре (грифельне)
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА:	41,0 %
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ ОЛІЇ:	21,5 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	7
Стійкість до осипання	8
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пероноспороз	9
Фузаріоз	9
Аскохітоз	9
Бактеріоз	9

ЕВРІДІКА

Високоадаптивний до умов вирощування сорт з високими показниками посухостійкості і толерантності до хвороб, високоврожайний, має високий вміст білку в зерні

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	від раннього до середнього (середньоранній)
ТИП РОСТУ:	напівдетермінантний
ВИСОТА РОСЛИН:	65 – 80 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	12 – 20 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	5,4 т/га
ЗАБАРВЛЕННЯ ОПУШЕННЯ:	рудувато-коричневе
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	фіолетове
ЗАБАРВЛЕННЯ ОБОЛОНКИ НАСІНИНИ:	зеленувато-жовте
ЗАБАРВЛЕННЯ РУБЧИКА НАСІНИНИ:	світло-коричневе з білим вічком
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА:	42,0 %
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ ОЛІЇ:	21,8 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	8
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пероноспороз	9
Фузаріоз	9
Аскохітоз	9
Бактеріоз	9

СЕРЕНАДА

Сорт добре розкриває свій генетичний потенціал за інтенсивної технології вирощування, характеризується високою стабільною і продуктивністю

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	від раннього до середнього (середньоранній)
ТИП РОСТУ:	детермінантний
ВИСОТА РОСЛИН:	70 – 90 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖЬОГО БОБА:	8 – 15 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,0 т/га
ЗАБАРВЛЕННЯ ОПУШЕННЯ:	сіре
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	фіолетове
ЗАБАРВЛЕННЯ ОБОЛОНКИ НАСІНИНИ:	жовте
ЗАБАРВЛЕННЯ РУБЧИКА НАСІНИНИ:	світло-коричневе
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА:	40,0 %
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ ОЛІЇ:	20,5 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	7	
Стійкість до вилягання	7	
Стійкість до осипання	7	
Маса 1000 зерен	6	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пероноспороз	7	
Фузаріоз		9
Аскохітоз	8	
Бактеріоз	8	

ФЕНІКС

Високоврожайний сорт з активною азотфіксувальною здатністю, стійкий до основного комплексу хвороб, високотехнологічний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	від раннього до середнього (середньоранній)
ТИП РОСТУ:	індетермінантний
ВИСОТА РОСЛИН:	90 – 100 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	14 – 20 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,2 т/га
ЗАБАРВЛЕННЯ ОПУШЕННЯ:	рудувато-коричневе
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	фіолетове
ЗАБАРВЛЕННЯ ОБОЛОНКИ НАСІНИНИ:	жовте
ЗАБАРВЛЕННЯ РУБЧИКА НАСІНИНИ:	світло-коричневе
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА:	41,3 %
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ ОЛІЇ:	19,2 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пероноспороз	9
Фузаріоз	9
Аскохітоз	9
Бактеріоз	9

Трилінійний гібрид, характеризується високим рівнем посухостійкості і жаростійкості, високоврожайний, толерантний до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:

Helianthus annuus L.

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:

110 – 115 діб

ВИСОТА РОСЛИН:

170 – 180 см

СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:

17 – 19 см

СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:

55 – 61,5 г

ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):

Express

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

раси А – Е

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

4,0 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

олійний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

Степ 45-55 тис./га,
Лісостеп 55-60 тис./га

ВМІСТ ОЛІЇ:

50 – 51,3 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Енергія початкового росту

8

Холодостійкість

7

Жаростійкість

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса

8

Стійкість до вовчка

8

Фомопсис

8

Біла гниль коріння

9

Біла гниль кошика

8

Сіра гниль

8

Фомоз

7

БАСТІОН

Трилійний гібрид, характеризується високим рівнем врожайності і вмісту олії в насінні, стійкий до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Helianthus annuus L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	110 – 115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	170 – 180 см
СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:	17 – 19 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	55 – 61,5 г
ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):	Express
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:	раси А – Е
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	олійний
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 45-55 тис./га, Лісостеп 55-60 тис./га
ВМІСТ ОЛІЇ:	50 – 51,3 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса	8
Стійкість до вовчка	8
Фомопсис	8
Біла гниль коріння	9
Біла гниль кошика	8
Сіра гниль	8
Фомоз	7

БУГ

Трилінійний гібрид, з високим рівнем посухостійкості, толерантний до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Helianthus annuus L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	118 – 120 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	150 – 180 см
СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:	18 – 22 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	55 – 60 г
ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):	Express
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:	раси А – Е
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,5 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	олійний
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 45-55 тис./га, Лісостеп 55-60 тис./га
ВМІСТ ОЛІЇ:	47 – 49 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	8
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса	9
Стійкість до вовчка	8
Фомопсис	8
Біла гниль коріння	7
Біла гниль кошика	8
Сіра гниль	8
Фомоз	8

ГУСЛЯР

Простий середньоранній гібрид з високим рівнем посухостійкості, високотехнологічний зі стабільно високими показниками врожайності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Helianthus annuus L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	112 – 115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	150 – 160 см
СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:	16 – 18 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	55 – 60 г
ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):	класична
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:	раси А – Е
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	5,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	олійний
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 45 – 55 тис./га, Лісостеп 60 – 65 тис./га
ВМІСТ ОЛІЇ:	50 – 52,5 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8	
Стійкість до вилягання	8	
Стійкість до осипання		9
Енергія початкового росту	8	
Холодостійкість	7	
Жаростійкість	7	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса		9
Стійкість до вовчка	8	
Фомопсис	7	
Біла гниль коріння	7	
Біла гниль кошика	7	
Сіра гниль	8	
Фомоз	7	

САНРОК

Простий, ранньостиглий гібрид, з високою енергією початкового росту, стійкий до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Helianthus annuus L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	100 – 105 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	160 – 170 см
СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:	17 – 19 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	52 – 55 г
ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):	Express
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:	раси А – F
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	3,9 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	олійний
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 45 – 55 тис./га, Лісостеп 60 – 65 тис./га
ВМІСТ ОЛІЇ:	48 – 50 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса	9
Стійкість до вовчка	8
Фомопсис	8
Біла гниль коріння	7
Біла гниль кошика	8
Сіра гниль	8
Фомоз	7

Трилінійний гібрид, характеризується високою посухостійкістю, толерантний до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:

Helianthus annuus L.

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:

112 – 115 діб

ВИСОТА РОСЛИН:

165 – 170 см

СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:

18 – 22 см

СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:

58 – 65 г

ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):

Express

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

раси А – F

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

5,1 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

олійний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

Степ 45 – 55 тис./га,
Лісостеп 55 – 60 тис./га

ВМІСТ ОЛІЇ:

48 – 50,1%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Енергія початкового росту

8

Холодостійкість

7

Жаростійкість

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса

9

Стійкість до вовчка

8

Фомопсис

8

Біла гниль коріння

7

Біла гниль кошика

8

Сіра гниль

8

Фомоз

7

МУЗА ФАО 360

Простий середньостиглий гібрид, з високими рівнем посухостійкості і продуктивності у своїй групі стиглості

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Zea mays L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	116–120 діб до повної стиглості
ВИСОТА РОСЛИН:	227–244 см
ВИСОТА ПРИКРІПЛЕННЯ КАЧАНІВ:	79–88 см
ВИХІД ЗЕРНА:	76–81 %
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	13,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
БІЛОК:	9,0–10,0 %
КРОХМАЛЬ:	71,5–72,5 %
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ – 50–55 тис./га, Лісостеп – 60–65 тис./га Полісся – 65–70 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Швидкість вологовіддачі	8
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	8
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пухирчата сажка	8
Фузаріоз	7
Летюча сажка	8
Стеблові гнилі	8

НОВЕЛА ФАО 250

НОВИНКА

Простий модифікований гібрид, який характеризується високою врожайністю у своїй групі стиглості, має зубоподібне зерно

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Zea mays L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	110–115 діб до повної стиглості
ВИСОТА РОСЛИН:	235–240 см
ВИСОТА ПРИКРІПЛЕННЯ КАЧАНІВ:	90–95 см
ВИХІД ЗЕРНА:	75–80 %
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	13,5 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
БЛОК:	9,0–11,5 %
КРОХМАЛЬ:	70,0–72,5 %
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ – 50–55 тис./га, Лісостеп – 60–65 тис./га Полісся – 65–70 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Швидкість вологовіддачі	8
Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пухирчата сажка	8
Фузаріоз	8
Летюча сажка	9
Стеблові гнилі	9

ШТОРМ ФАО 360

Простий гібрид, характеризується високими показниками стійкості до хвороб, високоврожайний, зерно зубоподібне, максимально розкриває свій потенціал за інтенсивної технології вирощування

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Zea mays L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	120–125 діб до повної стиглості
ВИСОТА РОСЛИН:	230–238 см
ВИСОТА ПРИКРІПЛЕННЯ КАЧАНІВ:	78–85 см
ВИХІД ЗЕРНА:	75–94 %
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	14,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно, силос
БІЛОК:	9,0–10,5 %
КРОХМАЛЬ:	70,0–72,0 %
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ – 50–55 тис./га, Лісостеп – 60–65 тис./га Полісся – 65–70 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Швидкість вологовіддачі	8	
Посухостійкість		9
Стійкість до вилягання		9
Енергія початкового росту	8	
Холодостійкість	8	
Жаростійкість	8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пухирчата сажка	8	
Фузаріоз	7	
Летюча сажка	8	
Стеблові гнилі	8	

ЮНГА ФАО 260

Середньоранній простий гібрид, характеризується високими показниками посухостійкості і продуктивності у своїй групі стиглості, має зубоподібне зерно

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Zea mays L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	112–115 діб до повної стиглості
ВИСОТА РОСЛИН:	225–250 см
ВИСОТА ПРИКРІПЛЕННЯ КАЧАНІВ:	75–90 см
ВИХІД ЗЕРНА:	75–80 %
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	13,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
БЛОК:	8,5–9,5 %
КРОХМАЛЬ:	72,0–72,5 %
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ – 50–55 тис./га, Лісостеп – 60–65 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Швидкість вологовіддачі	8	
Посухостійкість	8	
Стійкість до вилягання		9
Енергія початкового росту	8	
Холодостійкість	7	
Жаростійкість	8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пухирчата сажка	8	
Фузаріоз	8	
Летюча сажка		9
Стеблові гнилі		9

ВЕРБЛЮД

Стерильний міжвидовий гібрид, ранньостиглий, характеризується високим рівнем посухостійкості. Гібрид відмінно підходить для біоенергетичних цілей та на фураж

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Sorghum saccharatum L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	100 – 110 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	250 –300 см
ПРОДУКТИВНА КУЩИСТІСТЬ:	2,5 – 3,0
ВМІСТ РОЗЧИННИХ ВУГЛЕВОДІВ:	18 – 20 %
ТОВЩИНА СТЕБЛА:	20-25 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	60,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	фураж та біоенергетичні цілі
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 100 – 120 тис./га, Лісостеп 120 – 150 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Солевитривалість	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Летюча сажка	9
Покрита сажка	9
Стеблові гнилі	8
Попелиця	9
Бактеріоз	9

СТЕПОВИЙ

Синтетичний сорт, ранньостиглий, посухостійкий, характеризується високим потенціалом врожайності, кафське сорго

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Sorghum bicolor L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	105 – 110 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100 – 105 см
СЕРЕДНІЙ ДОВЖИНА ВОЛОТІ:	10 – 15 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	25 – 28 г
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	8,5 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 80 – 100 тис./га, Лісостеп 100 – 120 тис./га
ВМІСТ ЖИРУ:	3,0 – 3,2 %
ВМІСТ БІЛКА:	13,0 – 13,2 %
ВМІСТ КРОХМАЛЮ:	70 – 72 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Солевитривалість	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Летюча сажка	9
Покрита сажка	9
Стеблові гнилі	8
Попелиця	8
Бактеріоз	9

МЕРКУРІЙ

НОВИНКА

Синтетичний сорт соризу, ранньостиглий з високим рівнем посухостійкості і стабільності урожайності. Сорт відмінно підходить для харчо-концентратного використання

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Sorghum oryzoidum</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	105 – 110 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	115 – 125 см
СЕРЕДНІЙ ДОВЖИНА ВОЛОТІ:	20 – 24 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	40 – 42 г
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	9,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ – 60 – 80 тис./га, Лісостеп – 80 – 100 тис./га
ВМІСТ ЖИРУ:	3,5 – 3,6 %
ВМІСТ БІЛКА:	13,6 – 13,8 %
ВМІСТ КРОХМАЛЮ:	70 – 72 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Солевитривалість	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Летюча сажка	9
Покрита сажка	9
Стеблові гнилі	8
Попелиця	9
Бактеріоз	9

ВЕНЕРА

НОВИНКА

Сорт характеризується скороченим періодом спокою з активним осіннім відростанням

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	ранньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 100–115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100–115 см
ОБЛИСТЯЙНІСТЬ РОСЛИНИ:	57,9 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	0,4 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	32,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	6,6 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	переважно темні синьо-фіолетові квітки
КОЛІР ЗЕРНА:	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	17,8 %
ВМІСТ КЛІТКОВИНИ:	32 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Зимостійкість	9
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура та жовта плямистість	8
Кореневі гнилі	8

ІНТРИГА ОДЕСЬКА

Сорт має скорочений період спокою та відрізняється активним осіннім відростанням, при достатньому рівні вологозабезпечення здатен формувати додатковий укіс

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 77-111 доби
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
ОБЛИСТЯНІСТЬ РОСЛИНИ:	43 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	0,32 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	34,2 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	8,1 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	фіолетові, бузкові, світло-фіолетові, світло-рожеві
КОЛІР ЗЕРНА:	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	20 %
ВМІСТ КЛІТКОВИНИ:	32 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	7
Стійкість до вилягання	7
Зимостійкість	7
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура та жовта плямистість	8
Кореневі гнилі	8

ЛАДОСЛАВА

Сорт характеризується скороченим періодом спокою з активним осіннім відростанням

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 90-103 доби
ВИСОТА РОСЛИН:	90-115 см
ОБЛИСТЯЙНІСТЬ РОСЛИНИ:	41 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	0,32 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	32,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	8,6 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	фіолетове, світло-фіолетове, блакитне, бузкове зі змішаними білими або кремовими квітками
КОЛІР ЗЕРНА:	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	22 %
ВМІСТ КЛІТКОВИНИ:	31 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	7
Стійкість до вилягання	8
Зимостійкість	8
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура та жовта плямистість	8
Кореневі гнилі	8

ПІВДЕННА КРАСУНЯ

Сорт має скорочений період спокою з активним осіннім відростанням, характеризується високим рівнем посухо- і жаростійкості

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	ранньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 100–115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100–115 см
ОБЛИСТЯНІСТЬ РОСЛИНИ:	49 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	0,32 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	32,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	6,6 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	фіолетове, світло-фіолетове, блакитне, бузкове, рідко темні синьо-фіолетові зі змішаними білими або кремовими квітками
КОЛІР ЗЕРНА:	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	15,8 %
ВМІСТ КЛІТКОВИНИ:	29,7 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Зимостійкість	9
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура та жовта плямистість	8
Кореневі гнилі	8

СИНЬООКЕ ДИВО

НОВИНКА

Сорт зі скороченим періодом спокою та активним осіннім відростанням

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	ранньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 100–115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100–115 см
ОБЛИСТЯЙНІСТЬ РОСЛИНИ:	54 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	0,4 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	32,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	6,6 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	фіолетове, світло-фіолетове, блакитне, бузкове
КОЛІР ЗЕРНА:	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	18 %
ВМІСТ КЛІТКОВИНИ:	30 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Зимостійкість	9
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура та жовта плямистість	8
Кореневі гнилі	8

АДАМ

Двоукісний сорт, характеризується високими темпами відростання, можливе вирощування на одному місці до трьох років

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 100–120 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100–120 см
ЗАЛИСТЯНИСТЬ РОСЛИНИ:	48 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	1,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	22,3 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	6,5 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	рожевий
БОБИ:	із наявними зубчиками
КОЛІР ЗЕРНА:	світло коричневе
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	18 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	8
----------------	--------

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ПРИДБАННЯ НАСІННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ СОРТІВ

Заступник директора з інноваційно-інвестиційної роботи:

Домарацький Євгеній Олександрович, доктор с.-г. наук, професор
Тел.: (068) 466-90-09, e-mail: jdomar1981@gmail.com

Відділ насінництва:

Вишневецький Володимир Володимирович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
Тел.: (098) 796-46-16, e-mail: wsky@ukr.net

Ліцензійна група:

Царик Джанета Костянтинівна
Тел.: (048) 789-54-96, e-mail: sgi-marketing@ukr.net

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОЩУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ СОРТІВ

Відділ селекції та насінництва пшениці:

Литвиненко Микола Антонович, завідувач відділу, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН,
Заслужений працівник сільського господарства України, лауреат Державної премії України
Тел.: (050) 336-82-34, e-mail: dr_litvin@ukr.net

Лабораторія селекції інтенсивних сортів пшениці:

Лифенко Савелій Пилипович, головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор,
академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України;

Наконечний Микола Юрійович, завідувач лабораторії, канд. с.-г. наук;
Тел.: (096) 882-37-55, e-mail: labinsort@ukr.net

Лабораторія селекції та насінництва озимої твердої пшениці:

Паламарчук Анатолій Іванович, завідувач лабораторії, кандидат с.-г. наук
Тел.: (050) 673-26-87, e-mail: a_palamarchuk@ukr.net

Відділ селекції та насінництва ячменю:

Легкун Ігор Борисович, завідувач відділу, канд. с.-г. наук
Тел.: (067) 558-34-18, e-mail: legkun_i@ukr.net

Відділ селекції, генетики та насінництва бобових культур:

Січкач Вячеслав Іванович, завідувач відділу, доктор. біол. наук, професор
Тел.: (050) 542-08-65, e-mail: bobovi.sgi@ukr.net

Відділ селекції та насінництва перехреснозапильних культур:

Вареник Борис Федорович, завідувач відділу, канд. с.-г. наук, доцент, старший науковий співробітник
Тел.: (050) 962-15-59, e-mail: borisvar@ukr.net

**ДОБАЗОВЕ І БАЗОВЕ НАСІННИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ НАСІННЯ ВИВЕДЕНИХ В
СГІ-НЦНС СОРТІВ І ГІБРИДІВ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОСЛІДНІ ГОСПОДАРСТВА ІНСТИТУТУ:**

ДП «Експериментальна база «Дачна» СГІ-НЦНС

67624, Одеська обл., Одеський р-н, с. Дачне
Тел.: (067) 484-72-33, **E-mail:** dachnoe1932@gmail.com
В.о. директора **Семеніхін Михайло Павлович**

ДП «ДГ «Покровське» СГІ-НЦНС

67631, Одеська обл., Одеський р-н, с. Маринівка
Тел.: (50) 316-32-57, **E-mail:** pokrovske1963@gmail.com
В.о. директора **Баранов Олександр Леонтійович**

ДП «ДГ «Зелені Кошари» СГІ-НЦНС

55276 Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Зелені Кошари
Тел.: (067) 505-87-59, **E-mail:** zelen.koshariuaan@gmail.com
В.о. директора **Кривець Андрій Борисович**

ДП «ДГ «Комунар» СГІ-НЦНС

68544, Одеська обл., Болградський р-н, с. Весела Долина
Тел.: (096) 760-69-64, **E-mail:** dp_kommunar@ukr.net
В.о. директора **Волконогло Ігор Миколайович**

ДП «ДГ «Жеребківське» СГІ-НЦНС

66410, Одеська обл., Подільський р-н, с. Жеребкове
Тел.: (04863) 651-73, **E-mail:** gereb123@ukr.net
В.о. директора **Степанов Ілля Олександрович**

**РОЗМНОЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ НАСІННЯ СОРТІВ І
ГІБРИДІВ СГІ-НЦНС У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
ЗДІЙСНЮЮТЬ БАЗОВІ (ОПОРНІ) ГОСПОДАРСТВА:**

ТОВ «Світанок Старі Маяки»

66833, Одеська обл., Березівський р-н, с. Старі Маяки

Тел.: (050) 034-41-84, **E-mail:** psp.svitanok@ukr.net

ТОВ «Мічуріна+»

66031, Одеська обл., Подільський р-н, с. Писарівка

Тел.: (068) 329-52-49, **E-mail:** gchumak@gmail.com

СФГ «Балкани»

68252, Одеська обл., Б.-Дністровський район, с. Михайлівка

Тел.: (04848) 21-3-24, **E-mail:** balkani@ukr.net

ТОВ «НВП «Агро-Ритм»

66502, Одеська обл., Подільський р-н, с. Солтанівка

Тел.: (068) 805-09-16, **E-mail:** tovagro-ritm@ukr.net

Миколаївський національний аграрний університет

54020, Миколаївська обл., м. Миколаїв

Тел.: (0512) 34-10-82, **E-mail:** rector@mnaeu.edu.ua

ТОВ «ВВІ-Агро»

57437, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Новофедорівка

Тел.: (068) 731-93-74, **E-mail:** vvi-agro@ukr.net

ТОВ «Золотий Колос»

54046, Миколаївська обл., м. Миколаїв

Тел.: (0512) 424449, **E-mail:** 0933942900@ukr.net

ТОВ "Агроцентр "Раївський"

52502, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе

Тел.: (067) 614-59-72, **E-mail:** agrostepova@gmail.com

СТОВ АФ «Ольгопіль»

24830, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Ольгопіль

Тел.: (04351) 2-79-83, **E-mail:** olgopol@ukr.net

ТОВ «Рост Агро»

39053, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Погреби

Тел.: (044) 585-05-86, **E-mail:** rostagro@ukr.net

СТОВ «Колос»

63131, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Шелестове

Тел.: (067) 208-54-80, **E-mail:** office@agrotrade.ua