



СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Національний центр
насіннєзнавства та
сортовивчення

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ —
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

2026

КАТАЛОГ

СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ

**ДОБАЗОВЕ І БАЗОВЕ НАСІННИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ
НАСІННЯ ВИВЕДЕНИХ В СГІ-НЦНС СОРТІВ І ГІБРИДІВ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОСЛІДНІ ГОСПОДАРСТВА ІНСТИТУТУ:**

ДГ «Експериментальна база “Дачна”» СГІ-НЦНС

67624, Одеська обл., Одеський р-н, с. Дачне
Тел.: (067) 484-72-33, E-mail: dachnoe1932@ukr.net
В.о. директора **Семеніхін Михайло Павлович**

ДП «ДГ “Покровське”» СГІ-НЦНС

67631, Одеська обл., Одеський р-н, с. Маринівка
Тел.: (50) 316-32-57, E-mail: pokrovske1963@gmail.com
В.о. директора **Баранов Олександр Леонтійович**

ДП «ДГ “Зелені Кошари”» СГІ-НЦНС

55276 Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Зелені Кошари
Тел.: (067) 777-41-91, E-mail: zelen.koshariuaan@gmail.com
В.о. директора **Абдулаєв Ремзі Русланович**

ДП «ДГ “Комунар”» СГІ-НЦНС

68544, Одеська обл., Болградський р-н, с. Весела Долина
Тел.: (093) 098-23-29, E-mail: dp_kommunar@ukr.net
В.о. директора **Петриченко Іван Олександрович**

ДП «ДГ “Жеребківське”» СГІ-НЦНС

66410, Одеська обл., Подільський р-н, с. Жеребкове
Тел.: (050) 078-52-85, E-mail: gereb123@ukr.net
В.о. директора **Степанов Ілля Олександрович**

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ –
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

КАТАЛОГ

СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ –
НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ

Пшениця м'яка озима
Пшениця тверда озима
Ячмінь озимий (альтернативний)
Ячмінь ярий
Тритикале
Горох
Нут

Соняшник
Кукурудза
Сорго
Сориз
Соя
Люцерна
Еспарцет

Одеса – 2026

*Друкується за рішенням вченої ради інституту,
Протокол № 7 від 27.04.2026 р.*

Укладачі:

*Литвиненко М. А., Лифенко С. П., Рибалка О. І., Голуб Є. А.,
Наконечний М. Ю., Паламарчук А. І., Легкун І. Б., Вареник Б. Ф., Січкач В. І.,
Солоденко А.Є.*

За редакцією в. о. директора Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, академіка НААН, д. с.-г. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України **Вожеговой Р. А.**

Дається коротка характеристика нових перспективних сортів пшениці м'якої і твердої озимої, ячменю озимого і ярого, тритикале, кукурудзи, сорго, соризу, сояшнику, сої, нуту, гороху, люцерни, еспарцету, створених у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення і включених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Науково-методичні рекомендації

**КАТАЛОГ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ –
НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ**

ЗМІСТ

ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ОЗИМА

ВАГОМА	5
ВЕЛИЧАВА	6
ВИГОДА ОДЕСЬКА	7
ВІДПОВІДЬ ОДЕСЬКА	8
ВІРА ОДЕСЬКА	(новинка) ... 9
ВІРНИСТЬ	10
ГОСПОДАРКА ОДЕСЬКА	11
ГРОМАДА	12
ДАЧНЯНКА	13
ДОБРОДІЙКА ОДЕСЬКА	14
ДОВІРА ОДЕСЬКА	15
ЕПІГРАФ	16
ЕПІТЕТ	17
ЕТУАЛЬ	18
ЖИТНИЦЯ ОДЕСЬКА	19
ЗАГАДКА ОДЕСЬКА	(новинка) ... 20
ЗИСК	21
КАТРУСЯ ОДЕСЬКА	22
КОРОЛЕВА ОДЕСЬКА	23
МАКСИМА ОДЕСЬКА	24
МРІЯ ОДЕСЬКА	(новинка) ... 25
МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА	26
НАГОРОДА	(новинка) ... 27
НАДІЯ ОДЕСЬКА	(новинка) ... 28
НАСНАГА	29
НЕЗЛАМНА	(новинка) ... 30
ОЗОРЯНА	31
ОКРАСА	32
ОКТАВА ОДЕСЬКА	33
ОЛІМПІЯ ОДЕСЬКА	(новинка) ... 34
ОПТИМА ОДЕСЬКА	35
ОРАНТА ОДЕСЬКА	36
ОСНОВА ОДЕСЬКА	37
ПЕРЕВАГА	38
ПЕРЕМОГА ОДЕСЬКА	39
ПЕРСПЕКТИВА ОДЕСЬКА	40
ПОЗИЦІЯ ОДЕСЬКА	41
ПОКРОВСЬКА	42
САВЕЛІНА	(новинка) ... 43
САГА	(новинка) ... 44

СПАДЩИНА ОДЕСЬКА	45
ТВОРЧИСТЬ ОДЕСЬКА	(новинка) ... 46
УДАЧА ОДЕСЬКА	47
ФАВОРИТКА ОДЕСЬКА	48
ФОРТЕЦЯ	49
ЧОРНОБРОВА	50

ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА

АЛМАЗНИЙ	51
АРЕАЛ ОДЕСЬКИЙ	52
БЛИСКУЧИЙ	53
КОРАЛОВИЙ	54
ЛАЙНЕР	55
МАРМУРОВИЙ	(новинка) ... 56
НАДІЙНИЙ	57
ПРЕСТИЖНИЙ	58
СРІБЛЯСТИЙ	(новинка) ... 59
ШЛЯХЕТНИЙ	60
ЯНТАРНИЙ	61
ЯСКРАВИЙ	62
ФАКТОР ОДЕСЬКИЙ	63
ФАКІР ОДЕСЬКИЙ	64

ЯЧМІНЬ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ

ВАЛЬКІРІЯ	65
ГОРДІСТЬ ПАЛЬМІРИ	66
ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ	67
ДОСТОЙНИЙ	68
ЕВОЛЮЦІЯ	(новинка) ... 69
РУСИН	(новинка) ... 70
СКАРБ ПАЛЬМІРИ	71
СНІГОВА КОРОЛЕВА	72

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

АВАТАР	73
АДАПТ	74
ВАКУЛА	75
ГАЛИЧАНИН	76
ГУРУ	(новинка) ... 77
МОУРАВІ	78

НАДІЙНИЙ.....	(новинка) .. 79
НОВИЙ СВІТАНОК.....	(новинка) .. 80
СТАЛКЕР.....	81

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ

АЛЬБІНА.....	82
--------------	----

ГОРОХ

БІЛИЙ АНГЕЛ.....	83
КРУЇЗ.....	84
ПРИСТАНЬ.....	85

НУТ

БУДЖАК.....	(новинка) .. 86
ДОСТАТОК.....	87
ОДИСЕЙ.....	(новинка) .. 88
ПАМ'ЯТЬ.....	(новинка) .. 89
СКАРБ.....	90
ТРІУМФ.....	91

СОЯ

АВРОРА.....	92
ЕВРІДІКА.....	93
СЕРЕНАДА.....	94

СОНЯШНИК

БАР'ЄР.....	95
БАСТІОН.....	96
БУГ.....	97
ГУСЛЯР.....	98
САНРОК.....	99
ТІРАС.....	(новинка) .. 100

КУКУРУДЗА

ОПАЛ ФАО 250.....	(новинка) .. 101
САПІР ФАО 320.....	(новинка) .. 102
ТЕМБР ФАО 330.....	(новинка) .. 103
ЮНГА ФАО 260.....	104

СОРГО ЦУКРОВЕ

ВЕРБЛЮД.....	105
СТЕПОВИЙ.....	106

СОРИЗ

МЕРКУРІЙ.....	(новинка) .. 107
---------------	------------------

ЛЮЦЕРНА МІНЛИВА

ВЕНЕРА.....	(новинка) .. 108
ЛАДОСЛАВА.....	109
ПІВДЕННА КРАСУНЯ.....	110
СИНЬООКЕ ДИВО.....	(новинка) .. 111

ЕСПАРЦЕТ ЗАКАВКАЗЬКИЙ

АДАМ.....	112
Контактна інформація.....	113

Шановні колеги, партнери, виробники та всі, хто працює задля розвитку аграрної галузі України!

Сучасний розвиток сільського господарства відбувається в умовах нових глобальних викликів, пов'язаних зі змінами клімату, зростанням частоти посушливих явищ, поширенням нових рас збудників хвороб, нестабільністю природних ресурсів та необхідністю забезпечення продовольчої безпеки держави. За цих умов особливого значення набуває створення конкурентоспроможних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, здатних ефективно реалізовувати свій генетичний потенціал у різних ґрунтово-кліматичних умовах, забезпечуючи стабільність урожаю та високу якість продукції.

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортозведення вже понад століття залишається одним із провідних наукових центрів України у сфері селекції, генетики, насінництва та сортозведення. Накопичений науковий потенціал, багаторічний досвід і системна селекційна робота дають змогу створювати сорти нового покоління, що відповідають сучасним викликам та потребам аграрного виробництва.

Метою даного каталогу є представлення нових, високопродуктивних, адаптивних і районованих сортів та гібридів сільськогосподарських культур, створених ученими Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортозведення. Каталог покликаний стати практичним орієнтиром для агровиробників, науковців, фахівців аграрного сектору та всіх, хто зацікавлений у впровадженні сучасних селекційних досягнень у виробництво.

Результати багаторічної науково-дослідної роботи, сучасні методи генетики та селекції, широке використання колекційного матеріалу й інноваційних підходів дозволили створити сорти, які характеризуються високим рівнем продуктивності, адаптивності та господарсько цінних ознак. Особливу увагу під час селекційного процесу приділено формуванню стійкості до посухи, температурних стресів, основних хвороб і вилягання, підвищенню якості зерна, вмісту білка та інших важливих показників, що визначають ефективність сучасного агровиробництва.

Представлені у каталозі сорти й гібриди стануть надійною основою для підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва, забезпечення продовольчої безпеки та подальшого розвитку аграрного сектору України.



З повагою,
Paica ВОЖЕГОВА,
академік НААН України,
в. о. директора Селекційно-генетичного інституту –
Національного центру насіннєзнавства та сортозведення







ВАГОМА

Високий генетично обумовлений потенціал врожайності, висока позитивна реакція на покращення агрофону, за умови достатнього живлення формує високоякісне продовольче зерно, стійкий до вилягання, добре витримує відхилення від оптимальних строків сівби як у ранній бік, так і у пізній

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (256-275 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (88-92 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 39 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 780 – 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,4 – 14,4 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 26,4 – 29,4 %
СИЛА БОРОШНА: 300 – 420 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

										9
									8	
									8	
									8	
										9
									8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Буря іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

									8	
										9
									8	
							7			
					6					
							7			
									8	
									8	

ВЕЛИЧАВА

Високопродуктивний сорт з підвищеною морозо-, зимо- та посухостійкістю, з широкою екологічною та агротехнічною адаптивністю (відхилення в термінах посіву, зниження норми висіву, різні попередники]

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (258-276 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (93-97 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 5,0 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 9,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 38 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 780 – 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 14,2 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 29,5 %
СИЛА БОРОШНА: 290 – 400 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	7
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ВИГОДА ОДЕСЬКА

Сорт екстрасильної пшениці з високим потенціалом продуктивності та позитивною реакцією на підвищені дози азотних добрив

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для різних агрофонів та попередників

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (282 – 286 діб)
ВИСОТА РОСЛИН:	середньорослий (102 – 110 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні – оптимальні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 5,0 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	7,4 – 11,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	40,3 – 43,5 г
НАТУРА ЗЕРНА:	785 – 815 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	13,2 – 14,2 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29,5 – 34,2 %
СИЛА БОРОШНА:	420 – 460 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	7	9
Стеблова іржа	7	
Жовта іржа	7	
Септоріоз листя	7	
Піренофороз	7	
Фузаріоз колоса		
Тверда сажка	7	
Борошниста роса	7	

ВІДПОВІДЬ ОДЕСЬКА

Високопродуктивний сорт з групою стійкістю до захворювань

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для різних агрофонів, попередників, та умов зрошення

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (280 – 284 доби)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (90 – 98 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні - оптимальні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 8,2 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 37,1 – 42,0 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 780 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,8 – 14,6 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28 – 32 %
 СИЛА БОРОШНА: 360 – 380 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	7
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	9
Септоріоз листя	8
Піренофороз	9
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ВІРА ОДЕСЬКА

НОВИНКА

Короткостебловий сорт з винятковою стійкістю до вилягання та хвороб, стабільно високий урожай навіть у складних умовах

Тип сорту:

інтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

для посіву на високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

скоростиглий (252 – 260 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

короткостебловий (89 – 94 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

Оптимальні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

4,5 – 5,0 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

8,4 – 10,8 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

42 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

780 – 789 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

12,9 – 13,5 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

28 – 32 %

СИЛА БОРОШНА:

295 – 330 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

8

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

7

Піренофороз

7

Фузаріоз колоса

8

Тверда сажка

9

Борошниста роса

8

ВІРНІСТЬ

Сорт з високим потенціалом продуктивності, високий рівень посухостійкості, висока ефективність засвоєння добрив, стійкий до вилягання, добре витримує відхилення в строках сівби у пізніший бік

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (257-276 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (88-93 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 40 – 44 г
НАТУРА ЗЕРНА: 790 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ: 13,2 – 14,5 %
ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 26,4 – 28,7 %
СИЛА БОРОШНА: 290 – 350 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	7
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	6
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	8
Борошниста роса	7

ГОСПОДАРКА ОДЕСЬКА

Сорт екстрасильної пшениці з вираженою адаптивністю до факторів змін клімату та високим коефіцієнтом продуктивної куцистості

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для різних типів агротехніки та попередників

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (280 – 285 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (106 – 109 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 2,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,9 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 42 – 44 г
НАТУРА ЗЕРНА: 789 – 820 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 12,8 – 13,7 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28,4 – 33,6 %
СИЛА БОРОШНА: 430 – 480 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	4
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	7
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	7

ГРОМАДА

Інтенсивний, універсального використання з високою посухо- і жаростійкістю, вирізняється підвищеною адаптивністю до факторів в зміні агротехніки та клімату, що зумовлює здатність до стабільних і високих урожаїв зерна високої якості

Тип сорту: інтенсивний
 Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та універсальна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (255-270 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (82-92 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні – середньопізні
 НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,0 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,1 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 41 – 43 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 790 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,7 – 13,9 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 27,1 – 28,1 %
 СИЛА БОРОШНА: 300 – 330 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посуhostійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ДАЧНЯНКА

Інтенсивний, універсального використання, витривалий до середніх і низьких агрофонів та нетрадиційних попередників, ефективно використовує добрива, обумовлений високий генетичний потенціал урожайності

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (254-269 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (73-85 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,0 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,1 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 36 – 43 г
НАТУРА ЗЕРНА: 790 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,1 – 13,3 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 26,0 – 27,7 %
СИЛА БОРОШНА: 320 – 370 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	7
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	8
Борошниста роса	9

ДОБРОДІЙКА ОДЕСЬКА

Ектрасильний сорт з вираженою стабільністю показників продуктивності і якості зерна, толерантний до високого інфекційного навантаження

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (278 – 284 доби)
ВИСОТА РОСЛИН:	короткостебловий (89 – 96 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні - середньопізні
НОРМА ВІСІВУ:	3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	8,4 – 9,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	42 –44 г
НАТУРА ЗЕРНА:	820 – 860 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	13,4 – 14,2 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	32 – 34 %
СИЛА БОРОШНА:	330 – 380 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	7
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	8
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8

ДОВІРА ОДЕСЬКА

Сорт характеризується скоростиглістю у поєднанні з високою продуктивністю, стійкістю до хвороб та якістю зерна

Тип сорту: універсального типу з максимальною адаптацією до змін клімату
 Рекомендована технологія вирощування: на різних агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: скоростиглий (276 – 280 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (92 – 102 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні – пізні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,0 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,9 – 12,8 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 39,6 – 42,0 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 779 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,8 – 14,6 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 33 – 35 %
 СИЛА БОРОШНА: 360 – 420 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	8
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	9

ЕПІГРАФ

Ранньостиглий, високий потенціал продуктивності, високий рівень морозостійкості та посухостійкості, стійкий до вилягання, рекомендовано для вирощування на високих агрофонах по кращих попередниках

Тип сорту: високоінтенсивний
 Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранньостиглий (264-271 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (80-85 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,8 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 42 – 44 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 790 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 12,8 – 14,1 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 25,3 – 28,1 %
 СИЛА БОРОШНА: 280 – 300 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	6
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8

ЕПІТЕТ

З високою продуктивністю та підвищеними адаптивними властивостями, витримує погіршення агрофону та відхилення строків сівби від оптимальних

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (265-272 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (86-88 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 5,0 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,7 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 41 – 43 г
НАТУРА ЗЕРНА: 780 – 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,1 – 14,0 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 24,5 – 27,2 %
СИЛА БОРОШНА: 265 – 295 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

									9
								8	
								8	
						7			
									9
								8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

								8	
								8	
						7			
						7			
					6				
								8	
									9
								8	

ЕТУАЛЬ

Інтенсивного типу з високим генетичним потенціалом продуктивністю та широкою екологічною пластичністю для вирощування на високих і середніх агрофонах

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (266-273 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (85-91 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 44 – 47 г
НАТУРА ЗЕРНА: 790 – 810 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,0 – 13,5 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 26,3 – 26,6 %
СИЛА БОРОШНА: 280 – 310 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	7
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8

ЖИТНИЦЯ ОДЕСЬКА

Сорт «сильної» пшениці з груповою стійкістю до хвороб

Тип сорту:

високоінтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

для використання на високих і середніх агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньостиглий (282 – 287 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

короткостебловий (82 – 90 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні – середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

8,3 – 12,9 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

40,9 – 47,2 г

НАТУРА ЗЕРНА:

798 – 820 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,6 – 14,2 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

32 – 36 %

СИЛА БОРОШНА:

340 – 380 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

..... 9

Посухостійкість

..... 9

Жаростійкість

..... 9

Стійкість до вилягання

..... 8

Стійкість до осипання

..... 9

Стійкість до проростання зерен в колосі

..... 9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

..... 8

Стеблова іржа

..... 7

Жовта іржа

..... 7

Септоріоз листя

..... 7

Піренофороз

..... 8

Фузаріоз колоса

..... 9

Тверда сажка

..... 7

Борошниста роса

..... 9

ЗАГАДКА ОДЕСЬКА

НОВИНКА

Сорт володіє високою продуктивністю у поєднанні зі скоростиглістю, витривалістю до екстремальних умов змін клімату та спрощених технологій воєнного стану

Тип сорту:

високоінтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

для вирощування на високих і середніх агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

скоростиглий (275 – 280 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (96 – 104 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні - середньопізнi

НОРМА ВИСІВУ:

3,0 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

7,9 – 8,5 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

43 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

798 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

12,8 – 13,6 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

26,5 – 27,8 %

СИЛА БОРОШНА:

310 – 340 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

8

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

9

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

7

Піренофороз

7

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

9

Борошниста роса

9

ЗИСК

Генетично обумовлена висока продуктивність, підвищена пластичність та витривалість до різних умов вирощування, «екстрасильна» пшениця за якістю зерна, висока стабільність за показниками продуктивності та якості зерна

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна або напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (262-280 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (69-83 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 36 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 780 – 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,5 – 14,0 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 27,8 – 28,8 %
СИЛА БОРОШНА: 290 – 340 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	7
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	9
Борошниста роса	9

КАТРУСЯ ОДЕСЬКА

Сорт з високою стабільністю урожайності і якості зерна у варіюючих умовах вирощування

Тип сорту:

високоінтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

універсального використання на високих і середніх агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньостиглий (280 – 285 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

короткостебловий (84 – 90 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,0 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

7,9 – 11,4 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

40,7 – 45,8 г

НАТУРА ЗЕРНА:

780 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,8 – 14,5 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

33 – 38 %

СИЛА БОРОШНА:

320 – 340 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

9

Жаростійкість

9

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

9

Стеблова іржа

6

Жовта іржа

6

Септоріоз листя

8

Піренофороз

8

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

9

Борошниста роса

9

КОРОЛЕВА ОДЕСЬКА

Високий генетичний потенціал врожайності в поєднанні з адаптацією до змін клімату та стійкістю до основних хвороб

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для вирощування на високих і середніх агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: скоростиглий (265 – 277 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (96 – 102 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,8 – 9,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 42 – 45 г
НАТУРА ЗЕРНА: 792 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,2 – 13,7 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 27,3 – 28,9 %
СИЛА БОРОШНА: 360 – 380 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8	
Посухостійкість	8	
Жаростійкість	8	
Стійкість до вилягання		9
Стійкість до осипання	8	
Стійкість до проростання зерен в колосі		9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа		9
Стеблова іржа	8	
Жовта іржа	8	
Септоріоз листя	8	
Піренофороз	8	
Фузаріоз колоса		9
Тверда сажка		9
Борошниста роса	8	

МАКСИМА ОДЕСЬКА

Сорт з високим генетичним потенціалом врожайності в поєднанні з адаптацією до змін клімату

Тип сорту:

високоінтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

для вирощування на високих агрофонах за інтенсивної технології вирощування та в умовах зрошення

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньопізній (290 – 303 доби)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (96 – 106 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні - оптимальні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

7,9 – 12,5 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

40,0 – 43,0 г

НАТУРА ЗЕРНА:

785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

12,9 – 13,8 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

30 – 35 %

СИЛА БОРОШНА:

320 – 360 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

9

Жаростійкість

9

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

8

Піренофороз

8

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

8

Борошниста роса

8

МРІЯ ОДЕСЬКА

НОВИНКА

Сорт сильної пшениці, витривалий до морозів і посухи, придатний для органічного вирощування

Тип сорту:

універсального типу з високою реакцією на азотні добрива

Рекомендована технологія вирощування:

для різних агрофонів, включно з пізніми строками сіву

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньостиглий (257 – 270 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (95 – 98 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні – середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

8,4 – 10,8 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

42 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

780 – 797 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,1 – 14,2 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

27 – 32 %

СИЛА БОРОШНА:

320 – 345 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

7

Посухостійкість

8

Жаростійкість

7

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

6

Септоріоз листя

7

Піренофороз

6

Фузаріоз колоса

7

Тверда сажка

8

Борошниста роса

7

МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА

Екстрасильний сорт пшениці з високим потенціалом продуктивності та витривалістю до низьких і середніх агрофонів

Тип сорту: високоінтенсивного типу
 Рекомендована технологія вирощування: для універсального використання на різних агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (280 – 285 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (96 – 98 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - середньопізні
 НОРМА ВИСІВУ: 2,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,6 – 11,5 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 42,0 – 45,0 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 785 – 820 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,3 – 14,6 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 29 – 34 %
 СИЛА БОРОШНА: 486 – 527 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	6
Жовта іржа	6
Септоріоз листя	6
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	9

НАГОРОДА

НОВИНКА

Висока продуктивність та екологічна пластичність у поєднанні з високими показниками хлібопекарної якості

Тип сорту:

високоінтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньоранній (251-267 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (81-90 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

12,2 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

38 – 44 г

НАТУРА ЗЕРНА:

780 – 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,0 – 14,0 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

25,0 – 28,9 %

СИЛА БОРОШНА:

250 – 300 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

9

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

7

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

8

Септоріоз листя

6

Піренофороз

7

Фузаріоз колоса

8

Тверда сажка

9

Борошниста роса

7

НАДІЯ ОДЕСЬКА

НОВИНКА

«Екстрасильний» сорт, з максимальною адаптацією до змін клімату

Тип сорту:

універсального типу

Рекомендована технологія вирощування:

для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньостиглий (251 – 267 дїб)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (95 – 102 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

8,4 – 10,8 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

42 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

782 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ:

13,4 – 14,2 %

ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

32 – 35 %

СИЛА БОРОШНА:

380 – 430 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

7

Посухостійкість

8

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

8

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

7

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

6

Септоріоз листя

6

Піренофороз

6

Фузаріоз колоса

7

Тверда сажка

9

Борошниста роса

7

НАСНАГА

Короткостебловий сорт з високим генетично обумовленим рівнем продуктивності, ефективно реагує на підвищення агрофону, стійкий до вилягання, добре витримує відхилення в строках сівби, висока стабільність за показниками продуктивності та якості зерна

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (263-277 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (69-79 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні – середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 39 – 45 г
НАТУРА ЗЕРНА: 770 – 780 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,5 – 14,0 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28,4 – 29,0 %
СИЛА БОРОШНА: 280 – 290 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

	9
	8
	8
	9
	9
	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

	8
	8
	8
	7
	7
	8
	9
	9

НЕЗЛАМНА

НОВИНКА

Сорт з високим генетичним потенціалом продуктивності, на високому фоні мінерального живлення доповнюється відмінною якістю зерна, широка екологічна пластичність та адаптивність, добре витримує весняно-літні посухи

Тип сорту:

інтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна або напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньоранній (251-266 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (88-97 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні-середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 5,0 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

12,0 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

41 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

790 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ:

13,2 – 13,8 %

ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

26,7 – 27,4 %

СИЛА БОРОШНА:

300 – 330 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посухостійкість

9

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

7

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

7

Стеблова іржа

8

Жовта іржа

7

Септоріоз листя

6

Піренофороз

7

Фузаріоз колоса

8

Тверда сажка

9

Борошниста роса

7

ОЗОЛЯНА

Короткостебловий, ранньостиглий, високопродуктивний сорт з високим рівнем посухостійкості, придатний для умов підвищеної зволоженості або зрошення, стійкий до вилягання, дуже ефективно реагує на підвищення агрофону

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранньостиглий (267-269 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (80-83 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні-середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 38 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 770 – 780 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,5 – 14,0 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 26,3 – 28,0 %
СИЛА БОРОШНА: 260 – 390 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8

ОКРАСА

Ранньостиглий, інтенсивний сорт, характеризується високим рівнем посухостійкості та має високий генетичний потенціал продуктивності, який_ реалізує навіть за посушливих умов, стійкий до вилягання

Тип сорту: інтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранньостиглий (267-269 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (90-92 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні-середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 39 – 42 г
НАТУРА ЗЕРНА: 780 – 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,6 – 14,3 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 26,5 – 28,3 %
СИЛА БОРОШНА: 270 – 445 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8

ОКТАВА ОДЕСЬКА

Сорт з високим потенціалом продуктивності у поєднанні з груповою стійкістю до хвороб, має високі показники якості зерна

Тип сорту:

універсального типу

Рекомендована технологія вирощування:

для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньостиглий (286 – 288 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

відносно високорослий (104 – 112 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

7,8 – 11,9 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

42,0 – 44,0 г

НАТУРА ЗЕРНА:

798 – 825 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

12,8 – 13,4 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

29 – 34 %

СИЛА БОРОШНА:

336 – 368 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

9

Посухостійкість

9

Жаростійкість

9

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

8

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

9

Стеблова іржа

8

Жовта іржа

8

Септоріоз листя

7

Піренофороз

7

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

9

Борошниста роса

9

ОЛІМПІЯ ОДЕСЬКА

Скоростиглий сорт з високими показниками продуктивності і стійкості до хвороб, здатен формувати високу якість зерна

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для вирощування на середніх і високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	скоростиглий (265 – 279 діб)
ВИСОТА РОСЛИН:	короткостебловий (86–90 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні - середньопізнi
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	7,2 – 8,9 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	43 – 45 г
НАТУРА ЗЕРНА:	785 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	13,5 – 13,8 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	27,2 – 28,9 %
СИЛА БОРОШНА:	380 – 410 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	8
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	9

ОПТИМА ОДЕСЬКА

Сорт характеризується винятково високими показниками посухо-, жаростійкості, формує стабільний рівень продуктивності і якості

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (283 – 285 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: відносно високорослий (102 – 116 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - середньопізні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,3 – 10,7 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 39,5 – 44,2 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,2 – 14,6 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 32 – 36 %
 СИЛА БОРОШНА: 348 – 396 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посуhostійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	8
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	9

ОРАНТА ОДЕСЬКА

Високоврожайний сорт, придатний до пізніх строків сівби, здатний до прискореного проходження процесу загартування

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для вирощування на високих і середніх агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: скоростиглий (275 – 280 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (96 – 99 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - пізні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 8,4 – 11,9 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 41,5 – 45,3 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,2 – 14,6 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 32,5 – 36,4 %
 СИЛА БОРОШНА: 348 – 396 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	9
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	9

ОСНОВА ОДЕСЬКА

Скоростиглий сорт сильної пшениці з високим рівнем адаптації до змін клімату на півдні України

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах і попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: скоростиглий (275 – 278 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (90 – 92 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні - пізні
НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,9 – 9,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: Зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 40 – 43 г
НАТУРА ЗЕРНА: 790 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,2 – 13,6 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 31 – 33 %
СИЛА БОРОШНА: 360 – 390 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	6
Борошниста роса	8

ПЕРЕВАГА

Інтенсивного типу, універсального використання з високим рівнем адаптації до змін клімату та агротехнічних умов, висока екологічна пластичність, підвищена витривалість до низьких агрофонів і нетрадиційних попередників

Тип сорту: інтенсивний
 Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній (256-265 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (77-88 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні-середньопізні
 НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 5,0 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 9,8 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 41 – 43 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 790 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,4 – 13,9 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 27,2 – 27,8 %
 СИЛА БОРОШНА: 260 – 280 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	6
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ПЕРЕМОГА ОДЕСЬКА

Сорт відносно витривалий до ранніх строків сівби, володіє винятково високою позитивною реакцією на внесення азотних мінеральних добрив

Тип сорту: високоінтенсивного типу
Рекомендована технологія вирощування: для посіву на високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (282 – 285 діб)
ВИСОТА РОСЛИН:	короткостебловий (82 – 86 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні - середньопізні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 5,0 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	7,6 – 8,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	43 – 45 г
НАТУРА ЗЕРНА:	790 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	12,6 – 13,4 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	28 – 30 %
СИЛА БОРОШНА:	280 – 310 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ПЕРСПЕКТИВА ОДЕСЬКА

Сорт поєднує високу продуктивність, посухостійкість, стійкість до хвороб та витривалість до нетрадиційних попередників

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (285 – 287 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (102 – 109 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні - середньопізні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 6,9 – 10,2 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 43,2 – 45,8 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 785 – 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ: 12,5 – 13,7 %
 ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28 – 33 %
 СИЛА БОРОШНА: 355 – 395 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	8
Піренофороз	9
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	8

ПОЗИЦІЯ ОДЕСЬКА

Сорт з високим генетичним потенціалом врожайності в поєднанні з витривалістю до екстремальних змін клімату

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (287 – 290 діб)
ВИСОТА РОСЛИН:	короткостебловий (86 – 90 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні - оптимальні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	7,8 – 12,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	42 – 44 г
НАТУРА ЗЕРНА:	785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	12,8 – 13,6 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	28 – 35 %
СИЛА БОРОШНА:	310 – 350 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість		9
Посухостійкість		9
Жаростійкість		9
Стійкість до вилягання		9
Стійкість до осипання		9
Стійкість до проростання зерен в колосі		9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа		8
Стеблова іржа		8
Жовта іржа		7
Септоріоз листя		9
Піренофороз		8
Фузаріоз колоса		9
Тверда сажка		8
Борошниста роса		9

ПОКРОВСЬКА

Сорт відноситься до «екстрасильних» пшениць, витривалий до екстремальних посух

Тип сорту: високоінтенсивного типу з властивостями адаптації до змін клімату
 Рекомендована технологія вирощування: для посіву на високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий (280 – 283 доби)
 ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (90 – 98 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні - середньопізні
 НОРМА ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 11,2 – 12,8 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 42 – 43 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 782 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,4 – 14,2 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 32 – 35 %
 СИЛА БОРОШНА: 380 – 420 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	8
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	8
Борошниста роса	9

САВЕЛІНА

НОВИНКА

Інтенсивний сорт універсального використання з витривалістю до де-яких відхилень від оптимальних агротехнічних вимог, для вирощування по різних попередниках, формує повноцінне виповнене зерно з підвищеним вмістом білка, має підвищену стійкість до основних хвороб пшениці

Тип сорту:

інтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньоранній (256-265 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (94-96 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні-середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

10,3 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

43 – 46 г

НАТУРА ЗЕРНА:

790 – 810 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

12,7 – 13,2 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

24,7 – 26,9 %

СИЛА БОРОШНА:

250 – 280 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

9

Посухостійкість

9

Жаростійкість

8

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

8

Жовта іржа

8

Септоріоз листя

7

Піренофороз

6

Фузаріоз колоса

8

Тверда сажка

9

Борошниста роса

9

САГА

НОВИНКА

Інтенсивний з високим генетичним потенціалом продуктивності та підвищеною посухо-, жаростійкістю на різних етапах розвитку, стабільно формує високий рівень продуктивності та якості зерна, максимально адаптований до змін клімату

Тип сорту:

інтенсивний

Рекомендована технологія вирощування:

інтенсивна та напівінтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньоранній (255-265 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (92-100 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні-середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

4,0 – 5,0 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

11,2 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

40 – 43 г

НАТУРА ЗЕРНА:

780 – 790 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

12,3 – 13,5 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

24,2 – 27,9 %

СИЛА БОРОШНА:

240 – 270 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

8

Посуhostійкість

9

Жаростійкість

9

Стійкість до вилягання

8

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

8

Стеблова іржа

9

Жовта іржа

8

Септоріоз листя

7

Піренофороз

7

Фузаріоз колоса

9

Тверда сажка

7

Борошниста роса

8

СПАДЩИНА ОДЕСЬКА

Широка екологічна пластичність, «сильна» за якістю пшениця

Тип сорту:

універсального типу

Рекомендована технологія вирощування:

для використання на різних агрофонах в широкому діапазоні екологічних умов та змін клімату

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

середньостиглий (280 – 284 доби)

ВИСОТА РОСЛИН:

середньорослий (98 – 104 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

11,0 – 12,5 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

43 – 45 г

НАТУРА ЗЕРНА:

790 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,2 – 13,8 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

29 – 33 %

СИЛА БОРОШНА:

320 – 380 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Посухостійкість

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Жаростійкість

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Стійкість до вилягання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Стійкість до осипання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Стійкість до проростання зерен в колосі

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Стеблова іржа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Жовта іржа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Септоріоз листя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Піренофороз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Фузаріоз колоса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Тверда сажка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Борошниста роса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ТВОРЧИСТЬ ОДЕСЬКА

НОВИНКА

Висока продуктивність та екологічна пластичність у поєднанні з високими показниками хлібопекарної якості

Тип сорту:

високоінтенсивного типу

Рекомендована технологія вирощування:

для посіву на високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:

еритроспермум

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

скоростиглий (275 – 280 діб)

ВИСОТА РОСЛИН:

короткостебловий (86 – 90 см)

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

середньоранні - середньопізні

НОРМА ВИСІВУ:

3,5 – 4,5 млн/га

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

8,4 – 9,5 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

МАСА 1000 НАСІНИН:

42 – 44 г

НАТУРА ЗЕРНА:

785 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:

13,2 – 13,8 %

ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:

28,4 – 32,3 %

СИЛА БОРОШНА:

340 – 410 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість

9

Посухостійкість

9

Жаростійкість

9

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Стійкість до проростання зерен в колосі

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

7

Стеблова іржа

7

Жовта іржа

6

Септоріоз листя

6

Піренофороз

7

Фузаріоз колоса

7

Тверда сажка

6

Борошниста роса

7

УДАЧА ОДЕСЬКА

Сорт екстрасильної пшениці за якістю зерна з високим рівнем продуктивності та адаптацією до факторів зміни клімату

Тип сорту: універсального типу
Рекомендована технологія вирощування: для посіву на різних агрофонах та попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий (280 – 284 доби)
ВИСОТА РОСЛИН:	середньорослий (97 – 102 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньоранні - оптимальні
НОРМА ВИСІВУ:	3,5 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	8,2 – 12,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН:	42,8 – 46,5 г
НАТУРА ЗЕРНА:	798 – 800 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	13,4 – 13,9 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29,5 – 34,1 %
СИЛА БОРОШНА:	440 – 480 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	7
Септоріоз листя	7
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	7
Борошниста роса	8

ФАВОРИТКА ОДЕСЬКА

Сорт формує високу продуктивність у поєднанні з відмінними показниками якості та підвищеною толерантністю до стресових факторів довкілля

Тип сорту: універсального типу
 Рекомендована технологія вирощування: для посіву на середніх і низьких агрофонах та нетрадиційних попередниках

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
 ГРУПА СТИГЛОСТІ: скоростиглий (265 – 275 діб)
 ВИСОТА РОСЛИН: відносно високорослий (102–112 см)
 РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: середньоранні - середньопізні
 НОРМА ВИСІВУ: 2,5 – 4,5 млн/га
 ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 7,6 – 8,9 т/га
 НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
 МАСА 1000 НАСІНИН: 42 – 44 г
 НАТУРА ЗЕРНА: 790 – 798 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,2 – 14,4 %
 ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 28,5 – 29,5 %
 СИЛА БОРОШНА: 310 – 350 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	9
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8

ФОРТЕЦЯ

Короткостебловий, ранньостиглий, скорочений період вегетації дає змогу уникати весняно-літні ґрунтові і повітряні посухи, рекомендовано вирощувати на високому агрофоні по кращих попередниках, стійкий до вилягання, добре витримує зміщення строків сівби у пізній бік

Тип сорту: високоінтенсивний
Рекомендована технологія вирощування: інтенсивна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ: еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранньостиглий (253-269 діб)
ВИСОТА РОСЛИН: середньорослий (70-77 см)
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ: оптимальні-середньопізні
НОРМА ВИСІВУ: 4,0 – 4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ: 10,6 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: зерновий
МАСА 1000 НАСІНИН: 39 – 45 г
НАТУРА ЗЕРНА: 770 – 780 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ: 13,0 – 14,1 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ: 26,2 – 29,1 %
СИЛА БОРОШНА: 260 – 310 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість
Посухостійкість
Жаростійкість
Стійкість до вилягання
Стійкість до осипання
Стійкість до проростання зерен в колосі

8
9
9
8
9
8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа
Стеблова іржа
Жовта іржа
Септоріоз листя
Піренофороз
Фузаріоз колоса
Тверда сажка
Борошниста роса

8
9
8
7
7
8
7
9

ЧОРНОБРОВА

Сорт спеціального призначення – пшениця підвищеної харчової цінності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИДНІСТЬ:	еритроспермум
РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньопізнi
НОРМА ВИСІВУ:	4,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	8,6 т/га
КОЛІР ЗЕРНА:	темно-фіолетовий
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	хліб, крупи
МАСА 1000 НАСІНИН:	43–45 г
НАТУРА ЗЕРНА:	810 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14,5 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	31,3 %
СИЛА БОРОШНА:	210–230 о.а.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	7
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	8
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	8
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	8
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8

АЛМАЗНИЙ

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (до 56 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукурум
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

АРЕАЛ ОДЕСЬКИЙ

Сорт з високою продуктивністю (87-92 ц/га), має крупне за масою зерно (до 52 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	гордейформе
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-105 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн/га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	87-92 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посуhostійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	8
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

БЛИСКУЧИЙ

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (до 53 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукурум
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

КОРАЛОВИЙ

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (до 56 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	гордейформе
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посуhostійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ЛАЙНЕР

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (48-50 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукурум
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

МАРМУРОВИЙ

НОВИНКА

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (50-52 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукурум
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	92-97 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посуhostійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

НАДІЙНИЙ

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (до 55 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	гордейформе
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ПРЕСТИЖНИЙ

Сорт з високою продуктивністю (90-93 ц/га), має крупне за масою зерно (до 57 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукомелан
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-93 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посуhostійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

СРІБЛЯСТИЙ

НОВИНКА

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (48-50 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукурум
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ШЛЯХЕТНИЙ

Сорт з високою продуктивністю (95-100 ц/га), має крупне за масою зерно (до 50 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукурум
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-105 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	95-100 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посуhostійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ЯНТАРНИЙ

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (50-55 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукурум
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ЯСКРАВІЙ

Сорт з високою продуктивністю (90-95 ц/га), має крупне за масою зерно (до 52 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукомелан
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	90-95 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посуhostійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ФАКТОР ОДЕСЬКИЙ

Сорт з високою продуктивністю (85-90 ц/га), має крупне за масою зерно (47-50 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукомелан
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	95-100 см
СТРОКИ СІВБИ:	друга декада жовтня – перша листопада, перша-друга декада березня
НОРМА ВИСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	85-90 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість									9
Посухостійкість									9
Жаростійкість							8		
Стійкість до вилягання									9
Стійкість до осипання									9
Стійкість до проростання зерен в колосі								8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа								8	
Стеблова іржа						7			
Жовта іржа								8	
Септоріоз листя									9
Піренофороз						7			
Фузаріоз колоса						7			
Тверда сажка									9
Летюча сажка									9
Борошниста роса									9

ФАКІР ОДЕСЬКИЙ

Сорт з високою продуктивністю (85-90 ц/га), має крупне за масою зерно (48-50 г), зимостійкий, посухо- та жаростійкий.

Тип технології вирощування: інтенсивний, напівінтенсивний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	леукурум
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ та Лісостеп України
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	90-95 см
СТРОКИ СІВБИ:	третя декада вересня або перша жовтня
НОРМА ВІСІВУ:	4,5-5 млн./га схожих насінин
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	85-90 ц/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	круп'яна та макаронна промисловість

ЯКІСТЬ:

ВІМІСТ БІЛКУ:	14-16 %
ВІМІСТ КЛЕЙКОВИНИ:	29-33 %
ЧИСЛО ПАДІННЯ:	90-95 од.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посуhostійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	8
Стеблова іржа	7
Жовта іржа	8
Септоріоз листя	9
Піренофороз	7
Фузаріоз колоса	7
Тверда сажка	9
Летюча сажка	9
Борошниста роса	9

ВАЛЬКІРІЯ

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку, належить до європейської екологічної групи, вирізняється високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	80–85
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7–10
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–11,5
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	38–45

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	6
Ринхоспоріоз	6

ГОРДІСТЬ ПАЛЬМІРИ

Середньостиглий сорт голозерного ячменю альтернативного типу розвитку, продуктивний, придатний до механізованого збирання

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	coeleste
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	100–110
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–березень
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,0–8,3
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	11,5–13,8
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	40–44

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	7	
Посухостійкість	7	
Жаростійкість		9
Стійкість до вилягання		8
Стійкість до осипання		8
Стійкість до проростання зерен в колосі		8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка		9
Чорна летюча сажка		9
Тверда сажка		9
Борошниста роса	7	
Гельмінтоспоріоз	6	
Ринхоспоріоз	5	

ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку, вирізняється високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	115–125
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7–10,5
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–10
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	47–49

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	6

ДОСТОЙНИЙ

Ранньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку з дуже коротким періодом яровизації, високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	ранньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	90–110
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–березень
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,0–12,0
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	9–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	42–45

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	6
Ринхоспоріоз	6

ЕВОЛЮЦІЯ

НОВИНКА

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку з дуже довгим колоссям, високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	100–115
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7,6–9,3
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	9–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	41,2–44,5

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	8	
Посухостійкість	8	
Жаростійкість	8	
Стійкість до вилягання		9
Стійкість до осипання	8	
Стійкість до проростання зерен в колосі	8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка		9
Чорна летюча сажка		9
Тверда сажка		9
Борошниста роса		8
Гельмінтоспоріоз	6	
Ринхоспоріоз	5	

РУСИН

НОВИНКА

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку з високим потенціалом продуктивності для інтенсивних технологій

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	100–105
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7,9–9,5
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	43,9–46,2

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	5

СКАРБ ПАЛЬМІРИ

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку, з високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	100–110
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	6,1–9,5
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–10
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	46,4–48,1

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість									9
Посухостійкість									9
Жаростійкість								8	
Стійкість до вилягання								8	
Стійкість до осипання									9
Стійкість до проростання зерен в колосі								8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка									9
Чорна летюча сажка									9
Тверда сажка									9
Борошниста роса								8	
Гельмінтоспоріоз							7		
Ринхоспоріоз						6			

СНІГОВА КОРОЛЕВА

Середньостиглий сорт ячменю альтернативного типу розвитку, європейської екологічної групи, вирізняється високою зимостійкістю та високим потенціалом продуктивності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	90–95
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	жовтень–лютий
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7–10
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	9–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	44–48

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Чорна летюча сажка	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	6

АВАТАР

Сорт ярого ячменю з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	67–71
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	6–7
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно, фураж
ВМІСТ БІЛКА, %:	9–11
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	50–55

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	8
Ринхоспоріоз	6

АДАПТ

Сорт ярого ячменю, що належить до степової екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	medicum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	70–100
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	7,0–7,5
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	фураж
ВМІСТ БІЛКА, %:	11–12
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	47–63

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	7
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	6
Ринхоспоріоз	6

ВАКУЛА

Сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	80–100
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,0–9,6
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно, солод
ВМІСТ БІЛКА, %:	8–9
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	44–50
ВИРІВНЯНІСТЬ НАСІННЯ, %:	96
ЕКСТРАКТИВНІСТЬ, %:	>80

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Психостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	8
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	9
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	9
Ринхоспоріоз	7

ГАЛИЧАНИН

Інтенсивний сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	pallidum
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН, см:	60–65
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	шестирядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,5–9,0
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно, фураж
ВМІСТ БІЛКА, %:	10–12
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	45–50

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	8	
Жаростійкість	8	
Стійкість до вилягання		9
Стійкість до осипання	8	
Стійкість до проростання зерен в колосі	8	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	8	
Борошниста роса	7	
Гельмінтоспоріоз	8	
Ринхоспоріоз	6	

Районований за всіма зонами по всіх ділянках ДСВ. Дуже потужний старт росту. Формує міцний стеблостій. Стійкий до «перестою».

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	77-83
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	4-5
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	4,42-6,57
МАХ УРОЖАЙНІСТЬ ПО ЗОНАМ, т/га	7,25-8,25
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	12,7-13,7
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	53,8 (мах – 59,2)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	8
Борошниста роса	9
Гельмінтоспоріоз	8
Ринхоспоріоз	7

МОУРАВІ

Сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкості до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	72–75
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	6,8–9,4
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	10,5
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	48–54
ЕКСТРАКТИВНІСТЬ, %:	78–80

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	8
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	6

НАДІЙНИЙ

НОВИНКА

Сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи, вирізняється високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	75–80
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5–7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	6,5–8,3
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	12,5–13,8
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	47–50

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	7
Борошниста роса	8
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	6

НОВИЙ СВІТАНОК

НОВИНКА

Сорт ярого ячменю, що належить до європейської екологічної групи з високими показниками продуктивності та стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН, см:	72-75
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5-7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,7-8,9
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
ВМІСТ БІЛКА, %:	10,5
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	
ЕКСТРАКТИВНІСТЬ, %:	78-80

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	7
Борошниста роса	9
Гельмінтоспоріоз	8
Ринхоспоріоз	6

СТАЛКЕР

Ранньостиглий сорт ярого ячменю, що належить до степової екологічної групи, урожайний, високостійкий до стресових умов навколишнього середовища, вирізняється високою стійкістю до підвищеного сольового режиму ґрунту

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	nutans
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньоранній
ВИСОТА РОСЛИН, см:	70-100
ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ, см:	5-7
ТИП КОЛОСУ:	дворядний
СТРОКИ СІВБИ:	ранній
УРОЖАЙНІСТЬ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, т/га:	5,1-5,3
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно, фураж
ВМІСТ БІЛКА, %:	11-12
МАСА 1000 НАСІНИН, г:	50-55

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Сажка	8
Борошниста роса	7
Гельмінтоспоріоз	7
Ринхоспоріоз	7

АЛЬБІНА

Сорт вперше створений в Україні як сорт технічного спирто-дистильного напрямку використання. Призначений для виробництва якісного питного етилового спирту і біоетанолу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньопізній
ВИСОТА РОСЛИН:	середня
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	середньопізні
НОРМА ВИСІВУ:	2,0-2,5 млн/га
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	15,5 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	спирто-дистильний
МАСА 1000 НАСІНИН:	40-42 г
НАТУРА ЗЕРНА:	740 г/л

ЯКІСТЬ:

ВМІСТ БІЛКУ:	10,7 %
ВМІСТ КРОХМАЛЮ:	75,0-78,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зимостійкість	9
Посухостійкість	9
Жаростійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Стійкість до проростання зерен в колосі	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа	9
Стеблова іржа	9
Жовта іржа	9
Септоріоз листя	9
Піренофороз	8
Фузаріоз колоса	9
Тверда сажка	9
Борошниста роса	9

БІЛИЙ АНГЕЛ

Сорт з високими показниками генетичної стійкості до вилягання, придатний до вирощування за інтенсивної технології на високих агрофонах

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

Середньостиглий,
тривалість вегетаційного періоду 80–85 днів

ВИСОТА РОСЛИН:

50–60 см

ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:

40 см

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

4,0 т/га

КОЛІР ЗЕРНА

жовте

ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:

однорідне

ФОРМА ЗЕРНА:

циліндрична

СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКУ

23%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість



Стійкість до вилягання



Стійкість до осипання



Маса 1000 зерен



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Борошниста роса



Кореневі гнилі



Вірусні хвороби



КРУЇЗ

Середньорослий, високопродуктивний сорт, з високими показниками посухо- і жаростійкості, толерантний до основних хвороб, високоурожайний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

ВИСОТА РОСЛИН:

ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

КОЛІР ЗЕРНА

ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:

ФОРМА ЗЕРНА:

СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКУ

Степ, Лісостеп

Середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 75-80 днів

середньорослий, 65-75 см

45 см

4,0 т/га

жовте

однорідне

циліндрична

23%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість

Стійкість до вилягання

Стійкість до осипання

Маса 1000 зерен

									9
							7		
								8	
					5				

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Борошниста роса

Кореневі гнилі

Вірусні хвороби

								8	
									9
							7		

ПРИСТАНЬ

Сорт з високими показниками продуктивності та стійкості до осипання насіння, проявляє високу стабільність за різних умов вирощування

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	Середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 75-80 днів
ВИСОТА РОСЛИН:	60-70 см
ВИСОТА КРИПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	45 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,0 т/га
КОЛІР ЗЕРНА	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	циліндрична
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКУ	23%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	6

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Борошниста роса	8
Кореневі гнилі	9
Вірусні хвороби	7

БУДЖАК

НОВИНКА

Сорту притаманна висока посухостійкість, формує крупне за масою 1000 насінин зерно, толерантний до основних хвороб, добрі смакові якості, швидко розварюється

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	55-60 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖЬОГО БОБА:	22-24 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	3,0 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	відсутнє
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	біле
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	світло-жовте
ФОРМА НАСІНИНИ:	проміжна, поверхня морщиниста
РЕБРИСТІСТЬ:	помірна
ВМІСТ БІЛКА:	до 29,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	7
Аскохітоз	7

ДОСТАТОК

Сорту притаманна висока посухостійкість, формує крупне за масою 1000 насінин зерно, має високі показники стійкості до основних хвороб

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	40 – 60 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖЬОГО БОБА:	25 – 30 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	3,0 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	відсутнє
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	біле
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	світло-жовте
ФОРМА НАСІНИНИ:	від кулястої до кутастої
РЕБРИСТІСТЬ:	помірна
ВМІСТ БІЛКА:	до 27,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	7
Аскохітоз	7

ОДИСЕЙ

НОВИНКА

Перший у світі сорт проміжного типу, який формує крупне насіння, високорослий, має високі показники стійкості до основного комплексу хвороб, відноситься до цінних сортів

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Південний Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	60–70 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	22–24 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	3,0 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	відсутнє
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	біле
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	світло-жовте
ФОРМА НАСІНИНИ:	проміжна, поверхня морщиниста
РЕБРИСТІСТЬ:	помірна
ВМІСТ БІЛКА:	до 29,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	7
Аскохітоз	7

ПАМ'ЯТЬ

НОВИНКА

Сорту притаманна висока стійкість до повторного відростання при підвищеній вологості, високопродуктивний, толерантний до основних хвороб, добрі харчові та кормові якості

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	55–60 см
ВИСОТА КРИПЛЕННЯ НИЖЬОГО БОБА:	20–22 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	3,0 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	відсутнє
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	біле
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	світло-буре
ФОРМА НАСІНИНИ:	округла
РЕБРИСТІСТЬ:	помірна
ВМІСТ БІЛКА:	до 30,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	6

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	7
Аскохітоз	7

СКАРБ

Сорт формує крупне за масою 1000 насінин зерно, має високі показники стійкості до комплексу основних хвороб, відноситься до цінних сортів

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	55 – 65 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	22 – 24 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	3,6 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	відсутнє
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	біле
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	бежеве
ФОРМА НАСІНИНИ:	від кулястої до кутастої
РЕБРИСТІСТЬ:	помірна
ВМІСТ БІЛКА:	до 30,0 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	7
Аскохітоз	7

ТРИУМФ

Сорт формує крупне зерно, толерантний до комплексу основних хвороб, відноситься до цінних сортів

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий
ВИСОТА РОСЛИН:	55 – 60 см
ВИСОТА КРИПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	20 – 22 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,4 т/га
АНТОЦΙΑНОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СТЕБЛА:	відсутнє
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	біле
ЗАБАРВЛЕННЯ НАСІНИНИ:	бежеве
ФОРМА НАСІНИНИ:	від кулястої до кутастої
РЕБРИСТІСТЬ:	слабка
ВМІСТ БІЛКА:	до 28,9 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	7
Аскохітоз	7

АВРОРА

Сорт посухостійкий і високоадаптивний до умов вирощування, має відмінні показники стійкості до комплексу основних хвороб, добре розкриває свій потенціал продуктивності за інтенсивної технології вирощування

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	від раннього до середнього (середньоранній)
ТИП РОСТУ:	детермінантний
ВИСОТА РОСЛИН:	70 – 100 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖНЬОГО БОБА:	12 – 19 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,9 т/га
ЗАБАРВЛЕННЯ ОПУШЕННЯ:	рудувато-коричневе
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	фіолетове
ЗАБАРВЛЕННЯ ОБОЛОНКИ НАСІНИНИ:	зеленувато-жовте
ЗАБАРВЛЕННЯ РУБЧИКА НАСІНИНИ:	темно-сіре (грифельне)
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА:	41,0 %
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ ОЛІЇ:	21,5 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	7
Стійкість до осипання	8
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пероноспороз	9
Фузаріоз	9
Аскохітоз	9
Бактеріоз	9

ЕВРІДІКА

Високоадаптивний до умов вирощування сорт з високими показниками посухостійкості і толерантності до хвороб, високоврожайний, має високий вміст білку в зерні

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	від раннього до середнього (середньоранній)
ТИП РОСТУ:	напівдетермінантний
ВИСОТА РОСЛИН:	65 – 80 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖЬОГО БОБА:	12 – 20 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	5,4 т/га
ЗАБАРВЛЕННЯ ОПУШЕННЯ:	рудувато-коричневе
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	фіолетове
ЗАБАРВЛЕННЯ ОБОЛОНКИ НАСІНИНИ:	зеленувато-жовте
ЗАБАРВЛЕННЯ РУБЧИКА НАСІНИНИ:	світло-коричневе з білим вічком
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА:	42,0 %
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ ОЛІЇ:	21,8 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	8
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пероноспороз	9
Фузаріоз	9
Аскохітоз	9
Бактеріоз	9

СЕРЕНАДА

Сорт добре розкриває свій генетичний потенціал за інтенсивної технології вирощування, характеризується високою стабільною і продуктивністю

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	від раннього до середнього (середньоранній)
ТИП РОСТУ:	детермінантний
ВИСОТА РОСЛИН:	70 – 90 см
ВИСОТА КРІПЛЕННЯ НИЖЬОГО БОБА:	8 – 15 см
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,0 т/га
ЗАБАРВЛЕННЯ ОПУШЕННЯ:	сіре
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ:	фіолетове
ЗАБАРВЛЕННЯ ОБОЛОНКИ НАСІНИНИ:	жовте
ЗАБАРВЛЕННЯ РУБЧИКА НАСІНИНИ:	світло-коричневе
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА:	40,0 %
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ ОЛІЇ:	20,5 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	7	
Стійкість до вилягання	7	
Стійкість до осипання	7	
Маса 1000 зерен	6	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пероноспороз	7	
Фузаріоз		9
Аскохітоз		8
Бактеріоз		8

БАР'ЄР

Трилінійний гібрид, характеризується високим рівнем посухостійкості і жаростійкості, високоврожайний, толерантний до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Helianthus annuus L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	110 – 115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	170 – 180 см
СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:	17 – 19 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	55 – 61,5 г
ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):	Express
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:	раси А – Е
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	олійний
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 45-55 тис./га, Лісостеп 55-60 тис./га
ВМІСТ ОЛІЇ:	50 – 51,3 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса	8
Стійкість до вовчка	8
Фомопсис	8
Біла гниль коріння	9
Біла гниль кошика	8
Сіра гниль	8
Фомоз	7

БАСТІОН

Трилійний гібрид, характеризується високим рівнем врожайності і вмісту олії в насінні, стійкий до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Helianthus annuus L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	110 – 115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	170 – 180 см
СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:	17 – 19 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	55 – 61,5 г
ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):	Express
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:	раси А – Е
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	олійний
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 45-55 тис./га, Лісостеп 55-60 тис./га
ВМІСТ ОЛІЇ:	50 – 51,3 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса	8
Стійкість до вовчка	8
Фомопсис	8
Біла гниль коріння	9
Біла гниль кошика	8
Сіра гниль	8
Фомоз	7

БУГ

Трилінійний гібрид, з високим рівнем посухостійкості, толерантний до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Helianthus annuus L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	118 – 120 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	150 – 180 см
СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:	18 – 22 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	55 – 60 г
ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):	Express
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:	раси А – Е
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	4,5 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	олійний
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 45-55 тис./га, Лісостеп 55-60 тис./га
ВМІСТ ОЛІЇ:	47 – 49 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	8
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса	9
Стійкість до вовчка	8
Фомопсис	8
Біла гниль коріння	7
Біла гниль кошика	8
Сіра гниль	8
Фомоз	8

ГУСЛЯР

Простий середньоранній гібрид з високим рівнем посухостійкості, високотехнологічний зі стабільно високими показниками врожайності

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Helianthus annuus L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	112 – 115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	150 – 160 см
СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:	16 – 18 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	55 – 60 г
ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):	класична
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:	раси А – Е
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	5,2 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	олійний
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 45 – 55 тис./га, Лісостеп 60 – 65 тис./га
ВМІСТ ОЛІЇ:	50 – 52,5 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8	
Стійкість до вилягання	8	
Стійкість до осипання		9
Енергія початкового росту	8	
Холодостійкість	7	
Жаростійкість	7	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса		9
Стійкість до вовчка	8	
Фомопсис	7	
Біла гниль коріння	7	
Біла гниль кошика	7	
Сіра гниль	8	
Фомоз	7	

САНРОК

Простий, ранньостиглий гібрид, з високою енергією початкового росту, стійкий до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Helianthus annuus L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	100 – 105 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	160 – 170 см
СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:	17 – 19 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	52 – 55 г
ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):	Express
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:	раси А – F
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	3,9 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	олійний
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 45 – 55 тис./га, Лісостеп 60 – 65 тис./га
ВМІСТ ОЛІЇ:	48 – 50 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса	9
Стійкість до вовчка	8
Фомопсис	8
Біла гниль коріння	7
Біла гниль кошика	8
Сіра гниль	8
Фомоз	7

Трилінійний гібрид, характеризується високою посухостійкістю, толерантний до гербіцидів групи сульфонілсечовин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:

Helianthus annuus L.

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:

112 – 115 діб

ВИСОТА РОСЛИН:

165 – 170 см

СЕРЕДНІЙ ДІАМЕТР КОШИКА:

18 – 22 см

СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:

58 – 65 г

ТЕХНОЛОГІЯ (класична, Express, Clearfield):

Express

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

раси А – F

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

5,1 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

олійний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

Степ 45 – 55 тис./га,

Лісостеп 55 – 60 тис./га

ВМІСТ ОЛІЇ:

48 – 50,1%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Стійкість до осипання

9

Енергія початкового росту

8

Холодостійкість

7

Жаростійкість

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Несправжня борошниста роса

9

Стійкість до вовчка

8

Фомопсис

8

Біла гниль коріння

7

Біла гниль кошика

8

Сіра гниль

8

Фомоз

7

ОПАЛ ФАО 250

НОВИНКА

Простий модифікований, високоврожайний у своїй групі стиглості, зерно зубоподібне

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:

Zea mays L.

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

110–115 діб до повної стиглості

ВИСОТА РОСЛИН:

235–240 см

ВИСОТА ПРИКРІПЛЕННЯ КАЧАНІВ:

90–95 см

ВИХІД ЗЕРНА:

75–80 %

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

13,5 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

БІЛОК:

9,0–11,5 %

КРОХМАЛЬ:

70,0–72,5 %

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

Степ – 50–55 тис./га,

Лісостеп – 60–65 тис./га

Полісся – 65–70 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Швидкість вологовіддачі

8

Посухостійкість

8

Стійкість до вилягання

9

Енергія початкового росту

8

Холодостійкість

7

Жаростійкість

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пухирчата сажка

8

Фузаріоз

8

Летюча сажка

9

Стеблові гнилі

9

САПФІР ФАО 320

НОВИНКА

Простий, посухостійкий високоврожайний у своїй групі стиглості

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Zea mays L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	116–118 діб до повної стиглості
ВИСОТА РОСЛИН:	225–245 см
ВИСОТА ПРИКРІПЛЕННЯ КАЧАНІВ:	79–88 см
ВИХІД ЗЕРНА:	76–81 %
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	12,4 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
БЛОК:	9,0–10,0 %
КРОХМАЛЬ:	71,5–72,5 %
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ – 50–55 тис./га, Лісостеп – 60–65 тис./га Полісся – 65–70 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Швидкість вологовіддачі	8
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Енергія початкового росту	8
Холодостійкість	8
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пухирчата сажка	8
Фузаріоз	7
Летюча сажка	8
Стеблові гнилі	8

ТЕМБР ФАО 330

НОВИНКА

Простий, посухостійкий високоврожайний у своїй групі стиглості

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:

Zea mays L.

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ, Лісостеп, Полісся

ГРУПА СТИГЛОСТІ:

116–122 дів до повної стиглості

ВИСОТА РОСЛИН:

228–246 см

ВИСОТА ПРИКРІПЛЕННЯ КАЧАНІВ:

79–88 см

ВИХІД ЗЕРНА:

76–80 %

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

12,1 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерновий

БІЛОК:

9,0–10,0 %

КРОХМАЛЬ:

71,5–72,5 %

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

Степ – 50–55 тис./га,

Лісостеп – 60–65 тис./га

Полісся – 65–70 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Швидкість вологовіддачі

8

Посухостійкість

9

Стійкість до вилягання

9

Енергія початкового росту

8

Холодостійкість

8

Жаростійкість

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пухирчата сажка

8

Фузаріоз

7

Летюча сажка

8

Стеблові гнилі

8

ЮНГА ФАО 260

Середньоранній простий гібрид, характеризується високими показниками посухостійкості і продуктивності у своїй групі стиглості, має зубоподібне зерно

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Zea mays L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	112–115 діб до повної стиглості
ВИСОТА РОСЛИН:	225–250 см
ВИСОТА ПРИКРІПЛЕННЯ КАЧАНІВ:	75–90 см
ВИХІД ЗЕРНА:	75–80 %
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	13,8 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерновий
БЛОК:	8,5–9,5 %
КРОХМАЛЬ:	72,0–72,5 %
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ – 50–55 тис./га, Лісостеп – 60–65 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Швидкість вологовіддачі	
Посухостійкість	
Стійкість до вилягання	
Енергія початкового росту	
Холодостійкість	
Жаростійкість	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Пухирчата сажка	8
Фузаріоз	8
Летюча сажка	9
Стеблові гнилі	9

ВЕРБЛЮД

Стерильний міжвидовий гібрид, ранньостиглий, характеризується високим рівнем посухостійкості. Гібрид відмінно підходить для біоенергетичних цілей та на фураж

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Sorghum saccharatum L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	100 – 110 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	250 –300 см
ПРОДУКТИВНА КУЩИСТІСТЬ:	2,5 – 3,0
ВМІСТ РОЗЧИННИХ ВУГЛЕВОДІВ:	18 – 20 %
ТОВЩИНА СТЕБЛА:	20-25 см
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	60,0 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	фураж та біоенергетичні цілі
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 100 – 120 тис./га, Лісостеп 120 – 150 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Солевитривалість	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Летюча сажка	9
Покрита сажка	9
Стеблові гнилі	8
Попелиця	9
Бактеріоз	9

СТЕПОВИЙ

Синтетичний сорт, ранньостиглий, посухостійкий, характеризується високим потенціалом врожайності, кафське сорго

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:	<i>Sorghum bicolor L.</i>
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:	105 – 110 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100 – 105 см
СЕРЕДНІЙ ДОВЖИНА ВОЛОТІ:	10 – 15 см
СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:	25 – 28 г
РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:	оптимальні
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:	8,5 т/га
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:	зерно
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:	Степ 80 – 100 тис./га, Лісостеп 100 – 120 тис./га
ВМІСТ ЖИРУ:	3,0 – 3,2 %
ВМІСТ БІЛКА:	13,0 – 13,2 %
ВМІСТ КРОХМАЛЮ:	70 – 72 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	9
Стійкість до осипання	9
Солевитривалість	8
Холодостійкість	7
Жаростійкість	8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Летюча сажка	9
Покрита сажка	9
Стеблові гнилі	8
Попелиця	8
Бактеріоз	9

МЕРКУРІЙ

НОВИНКА

Синтетичний сорт соризу, ранньостиглий з високим рівнем посухостійкості і стабільності урожайності. Сорт відмінно підходить для харчо-концентратного використання

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

РІЗНОВИД:

Sorghum oryzoidum

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Степ

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД:

105 – 110 діб

ВИСОТА РОСЛИН:

115 – 125 см

СЕРЕДНІЙ ДОВЖИНА ВОЛОТІ:

20 – 24 см

СЕРЕДНЯ МАСА 1000 НАСІНИН:

40 – 42 г

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ СІВБИ:

оптимальні

ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ:

9,2 т/га

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ:

зерно

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

Степ – 60 – 80 тис./га,
Лісостеп – 80 – 100 тис./га

ВМІСТ ЖИРУ:

3,5 – 3,6 %

ВМІСТ БІЛКА:

13,6 – 13,8 %

ВМІСТ КРОХМАЛЮ:

70 – 72 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість

9
9
9
8
7
8

Стійкість до вилягання

Стійкість до осипання

Солевитривалість

Холодостійкість

Жаростійкість

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Летюча сажка

9
9
8
9
9

Покрита сажка

Стеблові гнилі

Попелиця

Бактеріоз

ВЕНЕРА

НОВИНКА

Сорт характеризується скороченим періодом спокою з активним осіннім відростанням

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	ранньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 100–115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100–115 см
ОБЛИСТЯНІСТЬ РОСЛИНИ:	57,9 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	0,4 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	32,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	6,6 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	переважно темні синьо-фіолетові квітки
КОЛІР ЗЕРНА:	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	17,8 %
ВМІСТ КЛІТКОВИНИ:	32 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Зимостійкість	9
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура та жовта плямистість	8
Кореневі гнилі	8

ЛАДОСЛАВА

Сорт характеризується скороченим періодом спокою з активним осіннім відростанням

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 90-103 доби
ВИСОТА РОСЛИН:	90-115 см
ОБЛИСТЯНИСТЬ РОСЛИНИ:	41 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	0,32 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	32,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	8,6 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	фіолетове, світло-фіолетове, блакитне, бузкове зі змішаними білими або кремовими квітками
КОЛІР ЗЕРНА:	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	22 %
ВМІСТ КЛІТКОВИНИ:	31 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	7
Стійкість до вилягання	8
Зимостійкість	8
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура та жовта плямистість	8
Кореневі гнилі	8

ПІВДЕННА КРАСУНЯ

Сорт має скорочений період спокою з активним осіннім відростанням, характеризується високим рівнем посухо- і жаростійкості

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	ранньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 100–115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100–115 см
ОБЛИСТЯНІСТЬ РОСЛИНИ:	49 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	0,32 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	32,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	6,6 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	фіолетове, світло-фіолетове, блакитне, бузкове, рідко темні синьо-фіолетові зі змішаними білими або кремовими квітками
КОЛІР ЗЕРНА:	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	15,8 %
ВМІСТ КЛІТКОВИНИ:	29,7 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посуhostійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Зимостійкість	9
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура та жовта плямистість	8
Кореневі гнилі	8

СИНЬООКЕ ДИВО

НОВИНКА

Сорт зі скороченим періодом спокою та активним осіннім відростанням

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп, Полісся
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	ранньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 100–115 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100–115 см
ОБЛИСТЯНІСТЬ РОСЛИНИ:	54 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	0,4 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	32,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	6,6 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	фіолетове, світло-фіолетове, блакитне, бузкове
КОЛІР ЗЕРНА:	жовте
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ніркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	18 %
ВМІСТ КЛІТКОВИНИ:	30 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Зимостійкість	9
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура та жовта плямистість	8
Кореневі гнилі	8

АДАМ

Двоукісний сорт, характеризується високими темпами відростання, можливе вирощування на одному місці до трьох років

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:	Степ, Лісостеп
ТИП СОРТУ:	інтенсивний
ГРУПА СТИГЛОСТІ:	середньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання до дозрівання 100–120 діб
ВИСОТА РОСЛИН:	100–120 см
ЗАЛИСТЯНИСТЬ РОСЛИНИ:	48 %
ПОТЕНЦІЙНА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ:	1,5 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ:	22,3 т/га
СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ СУХОЇ РЕЧОВИНИ:	6,5 т/га
КОЛІР КВІТКИ:	рожевий
БОБИ:	із наявними зубчиками
КОЛІР ЗЕРНА:	світло коричневе
ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА:	однорідне
ФОРМА ЗЕРНА:	ниркоподібне
СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКА У ЛИСТОСТЕБЛОВІЙ МАСІ НА СУХУ РЕЧОВИНУ:	18 %

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
Стійкість до осипання	9
Маса 1000 зерен	5

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Кореневі гнилі	8
----------------	---

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ПРИДБАННЯ НАСІННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ СОРТІВ

Заступник директора з науково-виробничої діяльності:

Донець Андрій Олександрович, кандидат с.-г. наук
Тел.: (095) 519-69-26, e-mail: agrogamalia2008@ukr.net

Відділ насінництва:

Вишневський Володимир Володимирович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
Тел.: (098) 796-46-16, e-mail: wsky@ukr.net

Ліцензійна група:

Царик Джанета Костянтинівна
Тел.: (048) 789-54-96, e-mail: sgi-marketing@ukr.net

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОЩУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ СОРТІВ

Відділ селекції та насінництва пшениці:

Литвиненко Микола Антонович, головний науковий співробітник відділу, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений працівник сільського господарства України, лауреат Державної премії України
Тел.: (050) 336-82-34, e-mail: dr_litvin@ukr.net

Лабораторія селекції інтенсивних сортів пшениці:

Лифенко Савелій Пилипович, головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України;

Наконечний Микола Юрійович, завідувач лабораторії, канд. с.-г. наук;
Тел.: (096) 882-37-55, e-mail: labinsort@ukr.net

Лабораторія селекції та насінництва озимої твердої пшениці:

Паламарчук Анатолій Іванович, завідувач лабораторії, кандидат с.-г. наук
Тел.: (050) 673-26-87, e-mail: a_palamarchuk@ukr.net

Відділ селекції та насінництва ячменю:

Легкун Ігор Борисович, завідувач відділу, канд. с.-г. наук
Тел.: (067) 558-34-18, e-mail: legkun_i@ukr.net

Голуб Євгенія Анатоліївна, в. о. завідувача відділу, кандидат с.-г. наук
Тел.: (097) 551-25-27, e-mail: eva.golub.1979@ukr.net

Відділ селекції, генетики та насінництва бобових культур:

Січкач Вячеслав Іванович, завідувач відділу, доктор. біол. наук, професор
Тел.: (050) 542-08-65, e-mail: bobovi.sgi@ukr.net

Відділ селекції та насінництва перехреснозапильних культур:

Вареник Борис Федорович, завідувач відділу, канд. с.-г. наук, доцент, старший науковий співробітник
Тел.: (050) 962-15-59, e-mail: borisvar@ukr.net

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

для нотаток

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings present.

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

**РОЗМНОЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ НАСІННЯ СОРТІВ СГІ-НЦНС
У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ЗДІЙСНЮЮТЬ
БАЗОВІ (ОПОРНІ) ГОСПОДАРСТВА:**

ТОВ «Світанок Старі Маяки»

66833, Одеська обл., Березівський р-н, с. Старі Маяки
Тел.: (050) 034-41-84, E-mail: psp.svitanok@ukr.net
Керівник: **Гладкий Олег Борисович**

ТОВ «Мічуріна+»

66031, Одеська обл., Подільський р-н, с. Писарівка
Тел.: (068) 329-52-49, E-mail: gchumak@gmail.com
Керівник: **Чумак Олександр Геннадійович**

СФГ «Балкани»

68252, Одеська обл., Б.-Дністровський район, с. Михайлівка
Тел.: (050) 316-41-83, E-mail: balkani@ukr.net
Керівник: **Златов Радослав Миколайович**

Миколаївський національний аграрний університет

54020, Миколаївська обл., м. Миколаїв
Тел.: (0512) 34-10-82, E-mail: rector@mnaeu.edu.ua
Керівник: **Шебанін Вячеслав Сергійович**

ТОВ «ВВІ-Агро»

57437, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Новофедорівка
Тел.: (068) 731-93-74, E-mail: vvi-agro@ukr.net
Керівник: **Чичета Андрій Борисович**

ТОВ «Золотий Колос»

54046, Миколаївська обл., м. Миколаїв
Тел.: (093) 394-29-00, E-mail: 0933942900@ukr.net
Керівник: **Іванова Надія Валеріївна**

ТОВ «Агроцентр «Раївський»

52502, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе
Тел.: (067) 614-59-72, E-mail: agrostepova@gmail.com
Керівник: **Рисін Артур Леонідович**

СТОВ АФ «Ольгопіль»

24830, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Ольгопіль
Тел.: (067) 432-29-70, E-mail: olgorol@ukr.net
Керівник: **Каленич Павло Євгенійович**

ТОВ «Рост Агро»

39053, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Погреби
Тел.: (050) 331-10-97, E-mail: rostagro@ukr.net
Керівник: **Бернацький Максим Михайлович**